



# Cardiocre



## 128/44. - USO DE DABIGATRÁN EN PACIENTES CON FA SOMETIDOS A CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA PROGRAMADA

*C. Arias Miranda, J. Ramos Maqueda, R. Guerola Segura y R. Pavón Jiménez*

*Hospital Nuestra Señora de Valme. Sevilla.*

### Resumen

**Introducción y objetivos:** El uso de los nuevos anticoagulantes orales para la prevención de ictus isquémicos en pacientes con FA no valvular que se someten a cardioversión eléctrica (CVE) ha sido objeto de recientes estudios. En nuestro trabajo analizamos la eficacia y seguridad del dabigatrán en este contexto.

**Material y métodos:** Estudio observacional retrospectivo efectuado en 25 pacientes sometidos a CVE de forma programada por FA persistente no valvular en nuestro hospital entre octubre de 2011 y enero de 2014, que estuvieron en tratamiento con dabigatrán en sus dos formas de presentación (110 y 150 mg cada 12h) durante las tres semanas previas y al menos las cuatro posteriores al procedimiento. Se recogieron las principales características clínicas de los pacientes, incluyendo la escala de riesgo CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-Vasc, y se estudió la eficacia del tratamiento anticoagulante a través de la tasa de eventos isquémicos o embólicos y su seguridad mediante la incidencia de sangrados, durante un tiempo de seguimiento mediana de 180 días.

**Resultados:** La edad media de los pacientes fue 57 años, con un CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-Vasc promedio de 1,24. El tiempo medio de tratamiento fue de 95 días. Se registraron únicamente dos episodios de hemorragias menores (8%), que no requirieron modificaciones en la actitud terapéutica, y ningún evento isquémico o embólico durante el tiempo de seguimiento.

**Conclusiones:** Nuestro estudio parece corroborar la eficacia y seguridad de dabigatrán en este contexto, si bien son necesarios estudios con mayor número de pacientes para conseguir una mayor evidencia científica.