CARDIOCORE. 2016;51(Espec Congr):124

Cardiocore

214/110 - Resultados a medio plazo del intervencionismo coronario percutáneo en pacientes diabéticos

M.J. Romero Reyes[1], N. Cobo Gómez[1], P. Escane Duarte[1], C. Arias Miranda[1], J. Ramos Maqueda[1], F.J. Molano Casimiro[2] y L. Pastor Torres[2]

[1]Médico Residente de Cardiología; [2]Jefe de Sección. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Valme. Sevilla.

Resumen

Introducción y objetivos: La prevalencia de diabetes mellitus en pacientes sometidos a un intervencionismo coronario percutáneo (ICP) es del 25-30%. Tras la revascularización, los pacientes diabéticos presentan un mayor riesgo recurrencia de eventos cardiovasculares. Nuestro objetivo fue analizar las diferencias en la mortalidad y la recurrencia de eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos sometidos a revascularización coronaria, respecto a no los diabéticos.

Material y métodos: Estudio de cohortes retrospectivo en el que se incluyeron a los pacientes sometidos a ICP en un solo centro entre noviembre de 2004 y marzo de 2009. Tras el ICP, se realizó un seguimiento de 12 meses en cada uno de los pacientes. Se recogieron distintas variables clínicas y epidemiológicas.

Resultados: Se incluyeron 768 pacientes, 331 diabéticos y 437 no diabéticos. Durante el seguimiento, en el grupo de pacientes diabéticos se halló un mayor riesgo de IAM (3,2 [IC95%, 1,2-8,4]; p = 0,013), muerte de causa cardiaca (2,2 [IC95% 1,3-3,7]; p = 0,002) y muerte por cualquier causa (2,2 [IC95% 1,4-3,3]; p < 0,001). No se hallaron diferencias significativas en el riesgo de reestenosis, lo cual podría deberse al escaso número de reestenosis en ambos grupos.

Conclusiones: Tras un ICP, los pacientes diabéticos tienen un mayor riesgo de IAM, mortalidad total y por causa cardiaca, por lo que debemos buscar nuevas estrategias que mejoren el pronóstico en este subgrupo de pacientes.

See front matter © 2016 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados