



Cardiocre



257/183 - MANEJO Y RESULTADOS DEL ANEURISMA EN UN SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO

P. Sáez Rosas¹, S. Camacho Freire², J. León Jiménez², M.T. Moraleda Salas³, F. Caro Fernández⁴, A. Sigismundi⁵ y J.F. Díaz Fernández²

¹Médico Residente de 4º año de Cardiología; ²FEA de Cardiología; ³Médico Residente de 5º año de Cardiología; ⁴Médico Residente de 3º año de Cardiología; ⁵Médico Residente de 2º año de Cardiología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Resumen

Introducción y objetivos: El aneurisma coronario (AC) se define como la dilatación que excede el diámetro de los segmentos adyacentes normales o el diámetro del vaso coronario más grande del paciente en 1,5 veces. Objetivo: describir manejo terapéutico y resultados a largo plazo de pacientes con AC.

Material y métodos: Muestra: de 12.600 angiografías realizadas enero 2009-diciembre 2015, se incluyeron 77 casos con aneurismas coronarios (AC).

Resultados: Se practicó ICP en 53,2% de los casos con AC (68% DES-farmacológico, 2,4 BVS-bioabsorbible, 19,5% BMS-convencional, 9,7 CABG) y 47 manejo conservador. El 93,5% de los tratados se fueron de alta con AAS, 80,5% doble antiagregación (principalmente con clopidogrel). 10,4% recibieron anticoagulación oral. La duración media de la terapia antiplaquetaria dual fue de $10 \pm 4,6$ meses (7,8% indefinida). Durante un seguimiento medio de 40 ± 29 meses, la tasa MACE fue del 40% (15 muertes: 3 muertes no CV, 8 muertes CV, 9 angina inestable, 5 IAM y 3 hemorragias no fatales, 2 accidentes cerebrovasculares). La tasa de revascularización de la lesión tratada en aneurismas fue del 12% (2 reestenosis tratados con balón con drogas y 3 nuevos implantes de DES). Se realizó un control angiográfico en el 32,4%.

Conclusiones: En el presente análisis independientemente de la gestión, la tasa MACE fue alta en un seguimiento a largo plazo.