



# Cardiocre



## 257/64 - SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST... ¿VARÍA CON LA EDAD LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO?

A.A. Rojas Sánchez<sup>1</sup>, A.M. García Bellón<sup>2</sup>, A.M. González González<sup>3</sup>, C. Lara García<sup>4</sup>, J.A. Arboleda Sánchez<sup>5</sup> y M. de Mora Martín<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Médico Residente de 2º año de Cardiología; <sup>2</sup>FEA Cardiología; <sup>4</sup>Médico Residente de 4º año de Cardiología; <sup>5</sup>FEA Medicina Intensiva; <sup>6</sup>Jefe de Servicio de Cardiología. Hospital Regional Universitario de Málaga. <sup>3</sup>FEA Cardiología. Hospital de Poniente. Algeciras.

### Resumen

**Introducción y objetivos:** Desconocemos si IAM en edad temprana incorpora pronóstico grave a largo plazo.

**Material y métodos:** Prospectivo y multicéntrico de FRCV en pacientes con SCACEST incluidos en Ariam Andalucía desde 1 enero 2012 al 31 diciembre 2016. Estudio comparativo en pacientes mayores y menores de 45 años. Para la comparación usamos chi cuadrado, nivel de significación 95%.

**Resultados:** 11.575 pacientes, 10,1% menores de 45 años. Varones menores de 45 años más fumadores (72% vs 39%,  $p < 0,001$ ), menos hipertensos (27% vs 54,3%,  $p > 0,0001$ ) menos diabéticos (7,8% vs 29,1%,  $p > 0,001$ ). Mujeres < 45 años más fumadoras (62,5% vs 12,6%,  $p > 0,0001$ ) menos dislipémicas (23,2% vs 46,5%,  $p < 0,0001$ ).

|                       | < 45 años   | > 45 años     | p        |
|-----------------------|-------------|---------------|----------|
| Hipertensión arterial | 294 (25%)   | 5.454 (52,4%) | < 0,0001 |
| Diabetes mellitus     | 84 (7,1%)   | 2.838 (27,3%) | < 0,0001 |
| Dislipemia            | 421 (35,8%) | 4.294 (41,3%) | < 0,0001 |
| Fumador               | 896 (76,2%) | 4.073 (39,2%) | < 0,0001 |
| Obesidad              | 250 (21,3%) | 1.895 (18,2%) | 0,012    |

**Conclusiones:** El tabaquismo factor de riesgo más relacionado en SCACEST en menores 45 años.