



# Cardiocre



## 323/133 - PERFIL DE PACIENTES ATENDIDOS POR FIBRILACIÓN AURICULAR EN UN SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

D. Clavijo Guerrero<sup>1</sup>, E. de Teresa Galván<sup>2</sup> y J.A. Rodríguez Montalvo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Estudiante de Medicina. Universidad de Málaga. Málaga. <sup>2</sup>Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

<sup>3</sup>Hospital Costa del Sol. Marbella.

### Resumen

**Introducción y objetivos:** La fibrilación auricular (FA) es un motivo frecuente de consulta en urgencias. El presente trabajo pretende analizar el perfil de dichos pacientes atendidos en un hospital general.

**Material y métodos:** Durante seis meses se identificaron 192 episodios de FA atendidos en urgencias en 171 pacientes, representando un 0,4% del total de episodios atendidos durante ese período en el Hospital Costa del Sol de Marbella.

**Resultados:** Edad media:  $68 \pm 13$  años. 52 casos presentaban patología cardiovascular acompañante. 57 casos tenían diabetes mellitus, 123 hipertensión arterial, 19 tabaquismo y 12 ACV previo. El CHADS2 medio:  $1,38 \pm 1,20$ . CHA2DS2-VASc medio:  $2,48 \pm 1,86$ . Tratamiento previo: 38% tomaban anticoagulantes, 18,8% antiagregantes, 36,5% betabloqueantes y 11,5% antiarrítmicos. Tratamiento en urgencias: cardioversión eléctrica 16,7%, antiarrítmicos 40,6%, betabloqueantes 56,8% y digoxina 12,5%. Del total de casos revirtieron a ritmo sinusal en urgencias el 48,4% y el 5,2% quedaron ingresados. 47 casos (24,5%) mantuvieron el mismo tratamiento al alta, frente al 75,5% en los que hubo alguna modificación (49,5% anticoagulante, 9,9% antiagregante, 49,5% betabloqueante y 10,4% antiarrítmico). No se produjeron nuevas consultas debidas a FA en las 72 horas posteriores al alta.

**Conclusiones:** Los pacientes atendidos por FA presentan edad avanzada y una alta frecuencia de factores de riesgo, como hipertensión y diabetes. Un elevado porcentaje revierten a ritmo sinusal en urgencias y el riesgo medio de tromboembolismo es elevado. En la mayoría de los casos se requiere iniciar tratamiento o hacer modificaciones en el previo, siendo los anticoagulantes el fármaco prescrito con mayor frecuencia.