



# Cardiocre



## 323/14 - TENDENCIAS EN EL PATRÓN DE ANTICOAGULACIÓN EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR EN UN CENTRO DE ALTA RESOLUCIÓN A LO LARGO DE UN LUSTRO

A.I. Pérez Cabeza<sup>1</sup>, M.E. Zambrano Medina<sup>2</sup>, A. Valle Alberca, A. Esteban Luque<sup>2</sup>, P.A. Chinchurreta Capote<sup>2</sup>, R. Bravo Marqués<sup>2</sup>, F. Mesa Prado<sup>2</sup>, S. López Tejero<sup>2</sup>, F. Ruiz Mateas<sup>2</sup> y F.A. Martos Pérez<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Hospital Costa del Sol. Hospital Alta Resolución de Benalmádena. Málaga. <sup>2</sup>Hospital Costa del Sol. Marbella.

### Resumen

**Introducción y objetivos:** Los antagonistas de vitamina K (AVK) han sido durante décadas el tratamiento de elección de la FA. Los anticoagulantes orales directos (ACOD) se plantean como alternativa a los mismos. Nos planteamos analizar los cambios en la estrategia de prevención tromboembólica llevada a cabo en un Centro de Alta Resolución en un periodo superior a 5 años.

**Material y métodos:** Estudio retrospectivo de pacientes con FA atendidos de forma ambulatoria en un centro hospitalario entre 2011 y 2012. Se recoge el tratamiento prescrito basalmente y en el momento actual (febrero 2018).

**Resultados:** Se incluyen 390 pacientes, edad media de  $71 \pm 11$  años, 52,8% varones, CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>VASc medio de  $3,1 \pm 1,6$  y HAS-BLED  $1,1 \pm 0,7$ . El 69,7% (n = 271) tenían prescritos anticoagulantes orales (249 AVK, 22 dabigatran) y 99 (25,4%) estaban antiagregados. De los 224 pacientes que completan el seguimiento (94 éxitos, 72 pérdidas de seguimiento) 110 reciben ACOD (49,1%), 82 AVK (36,6%), 1 HBPM, 23 antiagregación (10,3%) y 8 ningún tratamiento (3,6%). La persistencia del tratamiento es del 28,6% para la antiagregación, 52,1% para AVK y 80% para ACOD. El 60,7% de los pacientes antiagregados y el 42,4% de los tratados con AVK al inicio del estudio tienen prescritos ACOD al final del mismo.

**Conclusiones:** En nuestra muestra el porcentaje de pacientes anticoagulados ha aumentado un 23,5%, hasta alcanzar el 86,1%. El porcentaje de usuarios que reciben ACOD se ha multiplicado por 9, a expensas de pacientes que previamente tomaban antiagregantes y en segundo lugar AVK.