



## O-129 - ENSAYO CLÍNICO FASE I/IIA SOBRE SEGURIDAD Y FACTIBILIDAD DEL TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA PERIANAL CRIPTOGLANDULAR CON PLASMA RICO EN FACTORES DE CRECIMIENTO

J.J. Segura Sampedro, J.M. Díaz Pavón, M.V. Maestre Sánchez, J.L. Gollonet Carnicero, C. Palacios González, J.M. Vázquez Monchul, R. Jiménez Rodríguez y F. de la Portilla de Juan

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

### Resumen

**Objetivos:** Evaluamos la factibilidad y seguridad del uso del PRGF en el tratamiento de fístulas anales criptoglandulares (FACG).

**Métodos:** Se han incluido 46 pacientes (37 hombres), edad media  $51,74 \pm 12,66$  años con fístulas criptoglandulares medias-altas y con menos de 2 trayectos fistulosos, un 26 (56,5%) eran recidivadas. Basalmente se recogieron entre otras muchas variables, si fue posible realizar el procedimiento; así como las reacciones (RA) como los acontecimientos adversos (AA) a la semana, 3, 6 y 12 meses. Todos fueron tratados con PRGF extraído de su propia sangre, 20 (43,5%) pacientes portaban sedales previo al tratamiento.

**Resultados:** En los 46 pacientes el procedimiento fue factible. Se registraron un total de 11 RA catalogadas como relacionadas, 10 leves (3 dolor importante tratados con analgésicos, 7 infección zona quirúrgica que precisó prolongar los antibióticos) y 1 moderada (absceso tratado con antibiótico). El total de AA catalogados como no relacionados fueron 34 (cólicos nefríticos, fractura, lumbalgia, etc.).

**Conclusiones:** este estudio pone de manifiesto que el tratamiento de la FACG con PRGF es factible y seguro, siendo ahora necesario estudios prospectivos aleatorizados que determinen claramente su eficacia.