



# Cirugía Española



[www.elsevier.es/cirugia](http://www.elsevier.es/cirugia)

## P-084 - FÍSTULA ESOFAGOPLEURAL TRAS CIRUGÍA DE DIVERTÍCULO EPIFRÉNICO


*Esquiroz Carballo, Irune; Romero Pujana, Erika; Olmos Juste, Valle; Alberdi San Roman, Igor; Gómez-Acedo Bilbao, Leire; Galdiz Iturri, Martín; Ramos Jiménez, Félix Ángel*

*Hospital San Eloy, Barakaldo.*

### Resumen

**Introducción:** En la actualidad hay consenso en intervenir a los pacientes con síntomas esofágicos severos o aquellos en los que se haya objetivado un empeoramiento clínico en relación con un incremento considerable del tamaño diverticular.

**Caso clínico:** Paciente que es sometido a cirugía transhiatal laparoscópica para tratamiento de divertículo epifrénico presentando perforación esofágica tratada con sutura primaria y colocación de endoprótesis, durante el postoperatorio se objetiva una fistula esofagopleural originada en el borde superior de la endoprótesis. Se procede a la colocación de nueva endoprótesis acabalgada sobre la previa, cobertura antibiótica de amplio espectro, colocación de drenaje pleural y alimentación por sonda nasoyeyunal. Presenta buena evolución clínica confirmándose el cierre de la fistula a las 6 semanas, siendo dado de alta con buena tolerancia oral.



**Conclusiones:** Las fistulas esofágicas son una de las complicaciones más graves a las que nos enfrentamos tras este tipo de cirugías y que requiere un diagnóstico y tratamiento precoz.