



# Cirugía Española

[www.elsevier.es/cirugia](http://www.elsevier.es/cirugia)



## O-186 - ¿TIENEN MAYOR SUPERVIVENCIA LOS PACIENTES CON CÁNCER DE COLON IZQUIERDO? ANÁLISIS DE UN HOSPITAL ESPAÑOL DE TERCER NIVEL

Mirón Fernández, Irene; Mera Velasco, Santiago; González Poveda, Iván; Ruiz López, Manuel; Carrasco Campos, Joaquín; Toval Mata, José Antonio; Pérez Reyes, María; Santoyo Santoyo, Julio

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

### Resumen

**Introducción:** El cáncer de colon representa la segunda causa de muerte por neoplasia en España. Se han observado diferencias según su localización.

**Objetivos:** Analizar si existen diferencias en la supervivencia entre el cáncer de colon derecho (CCD) y el de localización izquierda (CCI).

**Métodos:** Estudio observacional retrospectivo, enero-2010 a diciembre-2017. Dos cortes de control a los 6 y a los 12 meses. Criterios de inclusión: colectomías programadas, 15 cm por encima del margen anal, mayores de edad y cirugía R0. Se excluyeron cirugías urgentes, cánceres sincrónicos o metacrónicos, recidivas y cirugías R1 o R2. Las variables se categorizaron por edad, sexo, IMC (índice de masa corporal), comorbilidades, cirugías previas, histología, ganglios aislados, supervivencia y mortalidad. El análisis estadístico mediante SPSS 22.0 consideró diferencias estadísticamente significativas ( $p < 0,05$ ).

**Resultados:** 398 pacientes con emparejamiento CCD/CCI 1:1. La edad y las comorbilidades se asociaron con CCD ( $p < 0,001$ ). El 6,8% de los exitus ocurrieron en los primeros 6 meses de la intervención. A los 12 meses fallecieron el 14,6%. La supervivencia global fue de  $93,35 \pm 1,24$  meses. Los pacientes con CCI presentaron una media de supervivencia 7 meses superior ( $p = 0,028$ ). No hubo diferencias significativas en cuanto a localización atendiendo a la causa de exitus (neoplásica o no neoplásica). En los primeros estadios se puede observar que la mayoría de los exitus son para los pacientes con CCD (estadio I  $p = 0,021$ , estadio II  $p = 0,014$ ). En los últimos estadios el reparto de los exitus no evidencia una desigualdad entre localizaciones (estadio III  $p = 0,683$ , estadio IV  $p = 0,898$ ).

**Conclusiones:** Se evidencia que CCD y CCI son significativamente diferentes en cuanto a supervivencia. Los pacientes con CCD tienen peor pronóstico, también en estadios precoces de la enfermedad. El hallazgo de estas diferencias podría implicar cambios en el tratamiento y en el seguimiento de estos pacientes.