




# Cirugía Española



[www.elsevier.es/cirugia](http://www.elsevier.es/cirugia)

## O-348 - ENCUESTA NACIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA EN ESPAÑA DURANTE LA FASE INICIAL DE LA PANDEMIA DE COVID-19

Prieto Calvo, Mikel<sup>1</sup>; Ielpo, Benedetto<sup>2</sup>; Jiménez Fuertes, Montiel<sup>3</sup>; Sarriugarte Lasarte, Aingeru<sup>1</sup>; González Sánchez, María del Carmen<sup>4</sup>; Martín Antona, Esteban<sup>5</sup>; Balibrea, Jose M<sup>a</sup><sup>6</sup>; Aranda Narvaéz, Jose Manuel<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Hospital de Cruces, Barakaldo; <sup>2</sup>Hospital del Mar, Barcelona; <sup>3</sup>Fundación Jiménez Díaz, Madrid; <sup>4</sup>Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; <sup>5</sup>Hospital Universitario La Paz, Madrid; <sup>6</sup>Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona; <sup>7</sup>Hospital Universitario Carlos Haya, Málaga.

### Resumen

La pandemia COVID-19 ha tenido una importante repercusión en los hospitales españoles, que han tenido que destinar todos los recursos disponibles al tratamiento de estos pacientes, reduciendo la capacidad de atender otras patologías habituales. Este estudio pretende analizar cómo se ha visto afectado el tratamiento de la apendicitis aguda. Se ha realizado un estudio nacional descriptivo mediante una encuesta online voluntaria, realizada en Google Drive™ distribuida por correo electrónico por la Asociación Española de Cirujanos (AEC) a todos los cirujanos miembros en activo (5.203) del 14 de abril al 24 de abril de 2020. Se han recibido 337 respuestas de 170 centros nacionales. Durante el primer mes de la pandemia ha disminuido la incidencia de apendicitis aguda. La opción quirúrgica ha sido la más utilizada tanto en cuadros simples como en complicados, aunque el manejo conservador se ha incrementado. A pesar de que el abordaje laparoscópico sigue siendo el más utilizado en nuestros hospitales, la vía abierta ha presentado un incremento durante esta pandemia.