



P-499 - COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA DE LA CARCINOMATOSIS PERITONEAL: NUESTRA EXPERIENCIA

Guijarro Moreno, Carlos; Gómez Sanz, Remedios; Ovejero Merino, Enrique; Lasa Unzúe, Inmaculada; López García, Adela; Marcos Hernández, Ruth; Gutiérrez Calvo, Alberto; Granell Vicent, Francisco Javier

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Resumen

Introducción y objetivos: La cirugía de la carcinomatosis peritoneal es un tipo de intervención quirúrgica de gran complejidad, en la que a menudo se realizan múltiples procedimientos que por separado presentan una morbilidad importante, y la administración de fármacos con gran citotoxicidad. Presentamos los resultados respecto a complicaciones de la cirugía de carcinomatosis de nuestro hospital.

Métodos: Hemos incluido a todos los pacientes que han recibido cirugía de la carcinomatosis peritoneal en nuestro servicio. De ellos hemos recogido de forma retrospectiva, a partir de la revisión de historias clínicas, datos referentes a las características del paciente y el cuadro clínico, al tipo de intervención (número de procedimientos, quimioterapia intraperitoneal) al tiempo de ingreso, a los reingresos en los primeros 30 días tras el alta y al tipo de complicaciones según la clasificación de Clavien modificada. Reunidos los datos, los hemos procesado mediante el programa SPSS.

Resultados: Se han realizado 72 cirugías de carcinomatosis peritoneal (N = 72). El índice medio de carcinomatosis es de $7,43 \pm 8,43$. Recibieron quimioterapia intraperitoneal 56 (77,8%). El tiempo medio de ingreso ha sido de $13,43 \pm 7,35$ días. La estancia media en la UCI ha sido de $5,19 \pm 5,79$ días. Han presentado complicaciones 44 de ellos (61,1%), de los cuales 33 (45,8%) han sido de tipo menor (Clavien I y II) y 11 (15,3%) han sido complicaciones mayores (Clavien III-V). Hemos tenido un exitus en el postoperatorio inmediato (1,38%). Se han realizado estudios de correlación entre el tipo de complicación (mayor, menor y ausencia) y la administración de quimioterapia intraoperatoria, el número de procedimientos y el índice de carcinomatosis

Conclusiones: La cirugía de la carcinomatosis peritoneal es una cirugía con una importante morbilidad. No hemos hallado correlación estadísticamente significativa entre el número de procedimientos quirúrgicos y la gravedad de las complicaciones, si bien sí que hay aproximación a unos resultados estadísticamente significativos en la correlación entre administración de quimioterapia intraoperatoria y un mayor número de complicaciones.