



Cirugía Española

www.elsevier.es/cirugia



O-360 - CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON CARCINOMA DE MAMA ANTES DE SER TRATADAS, EVALUADA MEDIANTE EL CUESTIONARIO BREAST-Q

Lozano, Ana; Paz, Lucía; Jimeno, Jaime; González, Erik; Lainez, Mario; Lagunas, Esther; Hernanz, Ana; Hernanz, Fernando

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Resumen

Objetivos. La incorporación de los resultados comunicados por las pacientes nos oferta la posibilidad de valorar y mejorar los servicios sanitarios. En el tratamiento del cáncer de mama, la neoplasia maligna más frecuente y prevalente en las mujeres, disponemos de un cuestionario validado BREAST-Q (módulo tratamiento conservador) para evaluar los cambios en la calidad de vida con el tratamiento y la satisfacción de las pacientes con el servicio sanitario recibido. El objetivo es evaluar el grado de satisfacción de las pacientes con sus mamas y la calidad de vida en los aspectos psicosocial, físico y sexual antes de ser tratadas con cirugía conservadora de la mama y radioterapia adyuvante.

Métodos: 160 pacientes cumplimentaron la parte preoperatoria del cuestionario BREAST-Q módulo Tratamiento conservador versión 2,0 en las dos semanas previas a la cirugía. El cuestionario una vez tabulado ofrece una puntuación de 0 a 100 (peor a mejor) en cuatro dominios: SM (satisfacción con las mamas), BPsico (Bienestar psicosocial), BFis (Bienestar físico), BSex (Bienestar sexual). Se recogieron las variables demográficas de las pacientes revisando la historia electrónica y mediante la entrevista personal. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS v. 19.

Resultados. Todas las variables cuantitativas, con excepción de la edad, no muestran una distribución normal. Edad 57 (DE 10,5) años. Índice masa corporal 26,5 (6) Kg/m². Menopáusicas 62,7%. Antecedentes familiares de cáncer de mama 43%. Fumadoras 27,3%. Comorbilidades 43,5%. Neoadyuvancia 18%. Puntuaciones (mediana, intercuartiles 25-75%). SM 58 (53-64), BPsico 71 (64-87), BFis 85 (72-100) y Bsex 66 (53-82,75). No hubo diferencias significativas entre las pacientes pre y posmenopáusicas ni entre las pacientes con tratadas con neoadyuvancia.

Conclusiones. Este trabajo aporta los datos basales de las pacientes antes de ser tratadas mediante tratamiento conservador.