



# Cirugía Española

[www.elsevier.es/cirugia](http://www.elsevier.es/cirugia)



## O-177 - IMPACTO EPIDEMIOLÓGICO TRAS 5 AÑOS DE CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL EN LA COMARCA DE TOLOSALDEA EN GUIPÚZCOA

López Deogracias, Maite<sup>1</sup>; Portillo Villares, Isabel<sup>2</sup>; Flores Jaime, Laura<sup>1</sup>; García Ruiz, Salud<sup>1</sup>; Abad Alonso, Rafael<sup>1</sup>; Querejeta Usabiaga, Juan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Clínica de la Asunción, Tolosa; <sup>2</sup>Departamento de Salud, Bilbao.

### Resumen

**Introducción:** En la Comunidad Autónoma Vasca el cáncer colorrectal es el tumor más frecuente en ambos sexos, siendo el segundo en hombres después del de próstata y el segundo en mujeres después del de mama. El 60% se detecta en fases avanzadas (estadios III y IV) con una supervivencia del 50% a los 5 años. La detección en fases iniciales supone una supervivencia > 95% a los 5 años.

**Objetivos:** Describir los principales resultados epidemiológicos del programa de cribado de CCR en la comarca de Tolosaldea (Guipúzcoa) tras 3 rondas consecutivas.

**Métodos:** Se ha realizado un estudio retrospectivo sobre las invitaciones realizadas a la población comprendida entre los 50 y 69 años de edad en la comarca de Tolosaldea (Guipúzcoa), durante el período de tiempo 2012-2016.

**Resultados:** Se observa una tendencia al incremento en el índice de participación en las rondas sucesivas, así como un aumento en la detección de lesiones premalignas y una discreta disminución en la detección de lesiones malignas.

**Conclusiones:** El cribado de cáncer colorrectal mantiene e incluso aumenta su alto índice de participación poblacional tras varias rondas consecutivas en la comarca de Tolosaldea, mantiene la elevada detección de lesiones premalignas y se aprecia una tendencia a disminuir el número de lesiones malignas identificadas.