



## OR-273 - RESULTADOS DEL TRATAMIENTO Y FACTORES PREDICTORES DE MORBIMORTALIDAD EN LOS VÓLVULOS DE SIGMA

Benítez Riesco, Ana; Moro Valdezate, David; Martín Arévalo, José; Pla Martí, Vicente; García Botello, Stephanie; Izquierdo Moreno, Ana; Pérez Santiago, Leticia; Espí Macías, Alejandro

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

### Resumen

**Objetivos:** Analizar los resultados del tratamiento de los vólvulos de sigma (VS) e identificar factores de riesgo de complicaciones y mortalidad.

**Métodos:** Se trata de un estudio observacional de todos los pacientes con diagnóstico de VS ingresados consecutivamente desde enero 2020 a diciembre 2020 en un hospital terciario para manejo conservador, cirugía urgente o cirugía electiva. Las variables resultado principales fueron la morbilidad posoperatoria a los 30 días, mortalidad y supervivencia global a 2 años. Se realizó un análisis de los factores de riesgo de mortalidad posoperatoria y mortalidad, y de factores pronósticos de supervivencia global a 2 años.

**Resultados:** Se incluyeron 92 pacientes. Se manejaron de forma conservadora 43 pacientes (46,7%), se intervinieron de forma urgente 27 pacientes (29,4%) y de forma electiva 22 pacientes (23,9%). La descompresión endoscópica tuvo éxito en el 87,8% de los casos, siendo la tasa de recurrencia del 47,2%. La mortalidad tras el episodio fue más elevada en los pacientes con manejo conservador que en aquellos sometidos a cirugía urgente o electiva (37,2%, 22,2%, 9,1%, respectivamente;  $p = 0,044$ ). La puntuación en la escala ASA  $> III$  fue un factor independiente de complicaciones (OR = 5,570, IC95% 1,740-17,829,  $p < 0,001$ ) y mortalidad (OR = 6,139, IC95% 2,629-14,335,  $p < 0,001$ ) y mortalidad (OR = 6,139, IC95% 2,629-14,335,  $p < 0,001$ ) fueron factores pronósticos independientes en la supervivencia global a 2 años.

**Conclusiones:** La descompresión endoscópica es eficaz en la mayoría de los pacientes con VS, sin embargo, presenta una alta tasa de recurrencias, morbilidad y mortalidad. La presencia de comorbilidades concomitantes importantes y el manejo conservador son factores pronósticos independientes para la morbilidad y la supervivencia en los VS.