



## 314 - IMPACTO DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL EN PACIENTES CON OBESIDAD MÓRBIDA

D. Romero<sup>a</sup>, A. Ciudin<sup>b</sup>, N. Castillejo<sup>b</sup>, E. Fidilio<sup>b</sup>, M. Velásquez<sup>b</sup>, G. Fidel<sup>b</sup>, J.M. Fort<sup>b</sup>, C. Hernández<sup>b</sup>, R. Simó<sup>b</sup> y J. Mesa<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Vall d'Hebron Insitut de Recerca (VHIR). Barcelona. España. <sup>b</sup>Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona. España.

### Resumen

**Introducción:** La obesidad mórbida (OM) es un importante problema de salud pública global, asociada a un gasto económico significativo, tanto por su alta prevalencia como por el número y gravedad de las comorbilidades asociadas. La OM se asocia con un alto grado de dificultades para llevar una vida social y laboral normal. La cirugía bariátrica (CB) induce una pérdida de peso significativa y sostenida pero los datos en la literatura son escasos sobre productividad laboral en pacientes con obesidad mórbida sometidos a CB.

**Objetivos:** Describir la relación entre la OM y la situación laboral antes y después de la CB.

**Métodos:** Estudio transversal mediante el cuestionario WPAI-GH y revisión de las historias clínicas de los pacientes con OM atendidos de forma consecutiva en la Unidad de OM de nuestro centro entre febrero-mayo 2017.

**Resultados:** Se han incluido 103 pacientes con edad media de  $48,73 \pm 11,6$  años, 72,1% mujeres, 87,5% raza caucásica. Un total de 55,8% no está actualmente empleado y el 8,65% se encuentra de baja laboral > 6 meses. El 65,04% de los casos habían sido sometidos a CB, y tuvieron un seguimiento medio de  $18,94 \pm 27,82$  meses. El 61,3% de los pacientes sometidos a CB no está empleado en la actualidad, de los cuales un 84,2% no lo estaban tampoco antes de la CB. Un 3,03% de los pacientes sometidos a CB que no estaban empleados previa CB se han reinsertado en el mercado laboral. La evolución del peso tras la CB ha sido satisfactoria (IMC previo  $44,12 \pm 6,8$  kg/m<sup>2</sup> versus IMC postCB  $33,4 \pm 5$  kg/m<sup>2</sup>,  $p < 0,001$ ).

**Conclusiones:** Un porcentaje significativo de los pacientes con OM sometidos a CB no están empleados en la actualidad, a pesar de la evolución satisfactoria sobre el peso. Se necesitan más estudios para caracterizar las particularidades socio-epidemiológicas de esta población y su relación con la productividad laboral.