



141 - EXPERIENCIA CLÍNICA CON EL PROGRAMA DE TELEASISTENCIA T-COACH EN DM-2 EN TRATAMIENTO CON INSULINA BASAL

S. Afán de Ribera de Palma, R. Sierra Poyatos, J. Cárdenas Salas, B. Luca, M.J. Silva Rodríguez, C. Suárez Vásquez y C. Vázquez Martínez

Fundación Jiménez Díaz UTE. Madrid.

Resumen

Introducción: T-Coach es un programa de apoyo de 24 meses que ayuda a los pacientes en tratamiento con insulina Toujeo al ajuste de la dosis y proporciona educación diabetológica general, facilitando la adquisición de habilidades y el aumento de la confianza que se requiere para tener éxito en el inicio de la insulinización y en el auto-manejo a largo plazo.

Objetivos: Valorar la eficacia del programa T-Coach comparando 30 pacientes que completaron el programa (graduados; G) frente a otros 37 que iniciaron el programa pero no lo completaron (no graduados; NG).

Métodos: Se ha revisado la historia clínica de 67 pacientes DM-2 que iniciaron tratamiento con insulina Toujeo y fueron incluidos en el programa. Se recogieron: edad, peso, glucemia basal, HbA1c y dosis requerida de insulina basal antes, a los 6 y 12 meses de entrar en el programa.

Resultados: La edad media fue $67,8 \pm 11$ años (G) frente a $69,8 \pm 11,9$ años (NG), peso $84,5 \pm 19,2$ kg (G) frente a $81,8 \pm 19,4$ kg (NG), HbA1c basal $8,9 \pm 1,9\%$ (G) frente a $8,4 \pm 1,3\%$ (NG), glucemia basal $199,8 \pm 87,4$ mg/dl (G) frente a $191,8 \pm 77,9$ mg/dl (NG) y la dosis inicial de insulina $25,1 \pm 16,4$ (G) UI frente a $27,6 \pm 18,5$ UI (NG). El 13,3% del grupo G y 13,5% del grupo no G presentaba HbA1c basal $< 7\%$. Las características del seguimiento se describen en la tabla. En ambos grupos se observó una reducción de glucemia basal y HbA1c a los 6 y 12 meses ($p < 0,05$) sin observar diferencias entre grupos. No se observaron cambios en el peso. En el grupo graduado se obtuvo resultado favorable con mayor porcentaje de pacientes con HbA1c $< 7\%$ a los 6 meses ($p < 0,05$).

		Graduados	No graduados
Cambio de glucemia (mg/dl)	6 m	-42,5 (-57,4 a -21,9)**	-38,0 (-102,4 a -10,4)**
	12 m	-33 (-55,6 a -18,6)**/n = 20	-43 (-92,5 a -1,6)**/n = 15
Cambio de HbA1C (%)	6 m	-1,35 (-2,0 a -0,3)**	-0,8 (-1,2 a -0,4)**
	12 m	-0,8 (-1,8 a 0)**/n = 20	-0,9 (-1,7 a -0,3)**/n = 12
Cambio en peso (kg)	6 m	-1,7 (-3,9 a 0,3)	-0,6 (-2,2 a 1,3)
	12 m	-2,2 (-3,8 a 1,9)/n = 16	-0,5 (-3,4 a 1,74)/n = 14

Cambio en dosis de insulina (UI)	6 m ⁺	+2 (0 a 9,4)**	-2 (-4 a 1)
	12 m	+1 (-0,3 a 8,4)/n = 19	0 (-4 a 2)/n = 15
Cambio en% de pacientes con HbA1C < 7%	6 m ⁺	+28,6% (1,4% a 41,1%)**	0 (-12,4% a 12,4%)
	12 m	+10% (-12,2% a 19,7%)	+21,4% (-15,5% a 35,4%)

Datos en media \pm DE; Mediana de la diferencia (IC95%). ⁺p < 0,05% entre grupos;**p < 0,05% respecto a basal.

Conclusiones: El programa T Coach constituye una herramienta eficaz en el refuerzo educativo de la DM-2 que ayuda a mejorar el control metabólico y optimizar el tratamiento.