



58 - PAPEL POTENCIAL DE LOS ÁCIDOS BILIARES Y DEL PÉPTIDO-YY EN LA REMISIÓN DE LA DIABETES MELLITUS TRAS CIRUGÍA BARIÁTRICA

M.A. Rubio Herrera^a, A. Amengual Galbarte^b, E. Bordiú Obanza^a, A. Barabash Bustelo^a, I. Ortega Madueño^c, N. Pérez Ferre^a, I. Jiménez Varas^a, A. Sánchez Pernaut^a, A. Torres García^a y A. Calle Pascual^a

^aHospital Clínico San Carlos. IDISSC. Madrid. ^bHospital Rey Juan Carlos. Madrid. ^cHospital Clínico San Carlos. IDISSC. Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM). Madrid.

Resumen

Introducción: En la remisión de DM2 (RemDM) tras cirugía bariátrica (CB) participan otros actores diferentes de GLP1, como los ácidos biliares (ABs), regulados por FGF-19 (receptor FXR ileal) e incremento PYY en islotes páncreas, activado por Ac. propiónico.

Objetivos: Analizar respuesta de hormonas gastrointestinales (HGI) y FGF19 en pacientes con o sin RemDM tras CB.

Métodos: Estudio prospectivo en 38 DM2 con IMC 30-39 kg/m², tras CB (sleeve o bypass). RemDM2 incluye HbA1c < 6,5% y glucemia < 126 mg/dl, sin medicación a 3 años. Determinación basal y 1 año tras CB de HGI y FGF19 tras test de comida mixta (TCM) (T-Diet-2, Vegenat-S.A). Muestras en 0, 30, 60, 90, 120 min para ghrelina, GIP, GLP1, glucagón, PYY3-36 y FGF19. También en pre/postCB: Leptina (LEP), adiponectina (ADP), FGF21. Estadística descriptiva, ANOVA, comparación de medias, χ^2 .

Resultados: Los remitores (n: 22; 56,4%), no diferían basalmente de los no-RemDM (n: 17; 43,6%), en edad, IMC o tipo de CB. Los RemDM tenían menos tiempo evolución DM2 (3,9 ± 2,8 frente a 7,6 ± 4,8 años; p < 0,01), menor insulinización (14 frente a 65%), mejor HbA1c (5,5 ± 0,4 frente a 6,5 ± 0,9; p < 0,01) y mayor % pérdida peso (%PP) a 3 años (27,6 ± 9,5 frente a 21,4 ± 7,9%; p = 0,04), pero similar péptido-C basal (4,4 ± 2,8 frente a 3,7 ± 1,7 ng/ml). No hubo diferencias significativas preCB entre grupos para ninguna de las HGI (basal ni tras curva de TCM), o FGF21. En los RemDM destaca mayor incremento de PYY y de FGF19 (tabla), así como mayor aumento de ADP.

Tipo	Min	GLP1	PYY3-36	FGF-19	ADP	LEP
REM	0'	26,3 ± 12,7	116,1 ± 39,7	184,2 ± 98,7	Pre: 8,3 ± 3,2	Pre:21,8 ± 7,6
	30'	202,5 ± 112,1	261,4 ± 110,5*	333,7 ± 173,1**	Post:13,5 ± 5,7*	Post:12,1 ± 4,6
NO-REM	0'	43,6 ± 18,1	97,0 ± 32,1	150,7 ± 98,5	Pre:7,1 ± 5,4	Pre:17,9 ± 3,3
	30'	215,1 ± 127,4	189,3 ± 89,9	185,4 ± 103,3	Post:9,7 ± 4,9	Post:11,6 ± 5,8

*p = 0,03; **p = 0,004 entre remitores y no remitores.

Conclusiones: 1) FGF-19 se incrementa notablemente tras CB solo en remitores, reflejando indirectamente aumento de ABs y cambios microbiota. 2) Mayor estímulo PYY ayuda a mejorar control glucémico y peso. 2) Mayor ADP en remitores (a igualdad de LEP), sugiere menor% grasa visceral, menos inflamación y mayor sensibilidad insulina.

Financiación: Mutua Madrileña de Investigación Biomédica. Fundación de Estudios Metabólicos.
Registro nº: ISRCTN57114193.