




Endocrinología y Nutrición



62 - EFECTO DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL REMODELADO ÓSEO A TRAVÉS DE LA VÍA OPG-RANKL

S. Botella Martínez^a, P. Restituto^b, I. Monreal^b, I. Colina^b, A. Calleja Canelas^b y N. Varo Cenarruzabeitia^b

^aComplejo Hospitalario de Navarra. Pamplona, España. ^bClínica Universidad de Navarra. Pamplona, España.

Resumen

Introducción: La actividad física tiene un efecto positivo sobre la masa ósea. Los mecanismos a través de los cuales ejerce este beneficio no se conocen en su totalidad. El sistema osteoprotegerina-ligando del Rank (OPG-RANKL) regula el proceso de remodelado para que sea equilibrado y se asegure una adecuada renovación ósea, aunque no hay suficientes datos sobre el papel que el ejercicio tiene sobre esta vía.

Objetivos: El objetivo de este estudio es analizar el efecto de distintos niveles de actividad física sobre el remodelado óseo mediante la determinación de los niveles de las proteínas solubles OPG y RANKL.

Métodos: Se realizó un estudio transversal en 72 mujeres premenopáusicas que fueron clasificadas según su nivel de actividad física en cuatro grupos: sedentaria (inactiva la mayor parte del tiempo), ligera (algún ejercicio suave tres veces por semana), moderada (algún ejercicio vigoroso tres veces por semana) o alta (algún ejercicio vigoroso cuatro o más veces por semana). Las mujeres fueron evaluadas mediante cuestionario clínico, densitometría ósea y determinación sérica de OPG y RANKL.

Resultados: Los niveles de OPG fueron significativamente mayores en aquellas mujeres con una actividad física alta frente a las de menor actividad (1.277 ± 207 vs 623 ± 58 ; $p < 0,05$). Asimismo, también se objetivaron niveles menores de RANKL en aquellas mujeres que realizaban mayor ejercicio ($0,53 \pm 0,06$ vs $0,92 \pm 0,18$) aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Tampoco se objetivaron diferencias estadísticamente significativas en la densidad mineral ósea entre los diferentes grupos.

Conclusiones: nuestros resultados sugieren que el efecto positivo que ejerce la actividad física sobre el tejido óseo, puede estar mediado en parte, y entre otros factores, por un aumento en los niveles de osteoprotegerina.