



# Gastroenterología y Hepatología



<https://www.elsevier.es/gastroenterologia>

## 171 - VALIDACIÓN AL CASTELLANO DEL CUESTIONARIO RAWL DE CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL CON SANGRE OCULTA EN HECES

M. Menéndez Rodríguez<sup>1</sup>, N. García Morales<sup>2,3</sup>, J. Garau Ramírez<sup>4</sup>, A. Traver Salvador<sup>5</sup>, Y. Hervás Jiménez<sup>4</sup>, T. Seoane Pillado<sup>6</sup>, N. Pin Vieito<sup>7,8,9</sup>, P. Vega Villamil<sup>7,8</sup>, A. Montes Martínez<sup>10,11,12</sup> y J. Cubiella<sup>7,8,9</sup>

<sup>1</sup>Centro de Salud de Lavadores, Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, Sergas. <sup>2</sup>Servicio de Digestivo, Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI), Vigo. <sup>3</sup>Grupo de Investigación Digestivo, Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IIS Galicia Sur), SERGAS-UVIGO, Vigo. <sup>4</sup>Centro de Salud Auxiliar de Chile, Área Hospital Clínic-Malvarrosa, Valencia. <sup>5</sup>Centro de Salud Morella, Área de Salud de Vinaroz. <sup>6</sup>Preventive Medicine and Public Health Unit, Department of Health Sciences, University of A Coruña-INIBIC, A Coruña. <sup>7</sup>Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Ourense. <sup>8</sup>Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. <sup>9</sup>Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Hepáticas y Digestivas, Ourense. <sup>10</sup>Área de Medicina Preventiva e Saúde Pública. Universidade de Santiago de Compostela. <sup>11</sup>Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS). <sup>12</sup>Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).

### Resumen

**Introducción:** La supervivencia del cáncer colorrectal (CCR) es del 57% a los 5 años, en parte debido a un diagnóstico tardío por una baja participación en los programas de cribado. Son necesarios instrumentos que analicen las causas de participación. El objetivo de este estudio fue comprobar la validez y consistencia interna de la versión en castellano del cuestionario de Rawl para el cribado de CCR con sangre oculta en heces.

**Métodos:** Metodología de validación de cuestionarios, realizado en tres centros de salud de Valencia. Se evaluaron las siguientes variables: edad, sexo, estado civil, nivel de estudios, clase social, consumo de tabaco, alcohol, índice de masa corporal, antecedentes personales y familiares de cáncer.

**Resultados:** Se estudiaron 408 individuos. La edad media fue de 59,45 (DE 5,17) años. La consistencia interna de todas las variables alcanzó una alfa de Cronbach de 0,796. El alfa de Cronbach de la dimensión beneficios del cribado fue de 0,871 y para la dimensión barreras al cribado fue de 0,817. Los coeficientes de correlación intraclase del test-retest para la dimensión de los beneficios del cribado fue de 0,809 (IC95% 0,606-0,913) y de 0,499 (IC95% 0,126-0,750) para las barreras.

**Conclusiones:** La versión en castellano del cuestionario Rawl es válido, fiable y reproducible. Con lo que disponemos de un elemento validado en España con el que objetivar barreras y beneficios percibidos en un programa de cribado poblacional.