



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

160/2029 - DETECCIÓN DE PRESCRIPCIONES POTENCIALMENTE INAPROPIADAS (PIP) EN FARMACIA COMUNITARIA. A PROPÓSITO DE UN CASO

O. Bellver Monzó^a, M.P. López Seguí^b y C. Daries Alfonso^b

^aFarmacéutico comunitario titular. Farmacia Bellver. Valencia. ^bFarmacéutica comunitaria adjunta. Farmacia Bellver. Valencia.

Resumen

Objetivos: Detectar las PIP en ancianos polimedcados usuarios habituales de la farmacia comunitaria. Informar a los pacientes sobre las prescripciones encontradas derivando al médico de cabecera siempre que sea necesario. Colaborar en el uso racional del medicamento favoreciendo la adherencia, previniendo RAMs y detectando inercia terapéutica.

Metodología: Entrevista al paciente con hoja de tratamientos activos, analítica más reciente. Se le entrega consentimiento informado. Se considera anciano polimedcado al mayor de 65 años con 5 o más medicamentos durante los últimos seis meses. En la entrevista se elabora perfil farmacoterapéutico del paciente, valorando necesidad, efectividad, seguridad de sus medicamentos, conocimiento de uso y adherencia al tratamiento. Se evalúa la presencia PIP con la herramienta informática Checkthemeds. Se clasifican según los criterios STOPP-START 2014. Se entrega información personalizada al paciente, derivando a su médico de cabecera con informe escrito sobre la PIP halladas.

Resultados: Paciente varón de 89 años. Riesgo vascular alto. En tratamiento de diabetes (metformina y linagliptina), HTA (telmisartan y amlodipino), hiperplasia prostática (tamsulosina), hipertrigliceridemia (gemfibrozilo) y cataratas (brimonidina/timolol). La analítica muestra un filtrado glomerular de 38 (CKD EPI) y creatinina de 1,6. El paciente refiere tos seca persistente. Se detectan 3 PIP (2 STOPP 1 START) así como una contraindicación de la metformina con el filtrado glomerular, lo que se comunica mediante informe escrito. Sin embargo, el médico no aceptó la intervención.

Conclusiones: Es posible realizar la detección de PIP en farmacia comunitaria. Las aplicaciones informáticas y las TICs facilitan el proceso. La intervención en este caso no fue tenida en cuenta y no se recibió respuesta del médico.