



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 212/2201 - ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES SOBRE VACUNACIÓN EN UN ÁREA DE SALUD

M. Gutiérrez Jansen<sup>a</sup>, R. Reina González<sup>a</sup>, J.A. González Pastor<sup>b</sup>, M.D. Padial Serrano<sup>b</sup>, S. Hazañas Ruiz<sup>c</sup>, A. Vargas-Machuca Cabañero<sup>c</sup>, M.J. Villas González<sup>d</sup>, F. Vivar Figuerola<sup>b</sup>, M.I. Muñoz Pérez<sup>b</sup> y L. Ginel Mendoza<sup>e</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria; <sup>e</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud El Consol. Málaga. <sup>c</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Limonar. Málaga. <sup>d</sup>Médico de Familia. Consultorio de Santa Rosalía-Maqueda y Centro de Salud Campanillas. Málaga.

### Resumen

**Objetivos:** Principal: conocer la actitud y el grado de conocimiento sobre vacunas de pacientes de Atención Primaria. Secundarios: conocer las principales patologías y hábitos susceptibles de requerir vacunación antigripal y antineumocócica en los pacientes encuestados y su actitud respecto a la vacunación.

**Metodología:** Estudio descriptivo, transversal, multicéntrico. Población: pacientes que acuden a consulta médica a demanda. Muestreo consecutivo. Participan 9 cupos médicos en cuatro centros de salud. Encuesta realizada en enero y junio de 2016. Variables a estudio: sociodemográficas (edad, sexo, estado civil, número de hijos, nivel socioeconómico y situación laboral). Presencia de enfermedad respiratorio crónica, enfermedad cardíaca, diabetes, neumonía previa y hábito tabáquico. Seis preguntas tipo Likert sobre conocimientos de vacunas valorada de 0 a 10 (0 totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo). Actitud frente a la vacunación de la gripe y el neumococo. Análisis estadístico: Frecuencias, media y desviación estándar.

**Resultados:** Encuestados 308. Edad media 49,7 años. 61,4% casados. Media de hijos 1,6. Nivel socioeconómico medio 82,3% y situación laboral activa 49,7%. Presentan enfermedad respiratoria crónica 14%, enfermedad cardíaca 9,7%, diabetes 13,3%, neumonía previa 6,8% y son fumadores 19,8%. El 44,8% de los encuestados tiene al menos una de estas patologías y/o hábito tabáquico. Puntuación preguntas tipo Likert: Las vacunas son importantes para la salud 8,4 (DE 1,6). Deberían ser obligatorias 7,57 (DE 2,07). Son seguras 7,87 (DE 1,84). Conozco las reacciones habituales que pueden tener 6,93 (DE 2,1). Su médico o enfermera le ha informado sobre las vacunas necesarias 7,13 (DE 2,6). Pueden prevenir enfermedades 8,03 (DE 2,01). En cuanto a la actitud para la vacunación, el 81,2% se vacunaría de la gripe y del neumococo, el 26,6% se vacunaría de la gripe pero no del neumococo, el 1% del neumococo pero no de la gripe. El 18,8% prefieren no vacunarse.

**Conclusiones:** Casi la mitad de los pacientes encuestados presentan patología crónica de base para vacunarse de neumococo, están de acuerdo que son importantes, seguras, sirven para prevenir enfermedades, los sanitarios le han informado y conocen efectos adversos. Más de dos tercios se vacunaría, aunque más de la cuarta parte lo haría de la gripe, pero no del neumococo.

**Palabras clave:** *Vacunación. Neumococo. Gripe. Atención Primaria.*