



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/858 - HEMANGIOENDOTELIOMA EPITELIOIDE HEPÁTICO

A. López Matarín^a, F. Leiva-Cepas^b, J.M. Madeira Martins^c, A. Rizo Barrios^d, F. Castaño Membrives^e, M. Gutiérrez Soto^a y M.D. Maestre Serrano^e

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria; ^eMédico de Familia. Unidad de Gestión Clínica Guadalquivir. Córdoba. ^bMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica de Occidente. Consultorio de Villarrubia. Córdoba. ^cMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica Fuensanta. Córdoba. ^dMédico Residente de Anatomía Patológica. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Resumen

Descripción del caso: Mujer de 43 años que acude a Urgencias por dolor en hipocondrio derecho de 3 semanas de evolución, modificable con la respiración y los movimientos junto con sensación nauseosa sin otra clínica acompañante. Antecedentes personales: Anemia ferropénica de origen ginecológico.

Exploración y pruebas complementarias: Aceptable estado general. Abdomen doloroso a la palpación en epigastrio, mesogastrio e hipocondrio derecho, sin otros hallazgos. Se solicita analítica, objetivándose anemia conocida y ecografía abdominal hallando dos lesiones focales hipoecogénicas bien definidas en lóbulo hepático izquierdo de 5,3 × 4 cm y de 3,1 × 2,4 cm, y otra lesión de 13 cm, heterogénea y de predominio hipoecogénica, en lóbulo hepático derecho. Ante los hallazgos se deriva a Medicina Interna, donde se realiza RMN, BAG y estudio histopatológico, con diagnóstico final de hemangioendoteliooma epitelioide.

Juicio clínico: Hemangioendoteliooma epitelioide hepático.

Diagnóstico diferencial: Hemangioma hepático, hemangiosarcoma hepático, metástasis hepáticas.

Comentario final: Se trata de una entidad infrecuente, de curso clínico y pronóstico impredecibles, con un potencial letal difícil de prever. Su diagnóstico es esencialmente a través de histopatología, y ha de tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de las lesiones focales hepáticas, pese a su escasa incidencia, dado su especial manejo.

Bibliografía

1. Choi KMoon W. Epithelioid hemangioendothelioma of the liver. *Clinical and Molecular Hepatology*. 2013;19:315.
2. Pareja E, Cortés M, Rayón M, Moya Á, Mir J. Hemangioendoteliooma epitelioide: un tumor hepático infrecuente. *Gastroenterología y Hepatología*. 2010;33:445-8.
3. Kenny A, Spina J, García Mónaco R. Hemangioendoteliooma epitelioide hepático: un desafío diagnóstico para el médico radiólogo. *Revista Argentina de Radiología*. 2014;78:35-41.

Palabras clave: *Hemangioendotelioma. Lesión focal. Hígado.*