



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 212/2146 - ECCEMA DISHIDRÓTICO EN PROBABLE PACIENTE ATÓPICO

M.Á. Sáez Moreno<sup>a</sup>, J. Rodríguez Coronado<sup>a</sup>, E.M. García Atienza<sup>a</sup>, R. Jiménez Lorenzo<sup>a</sup>, A. Fernández Bosch<sup>b</sup>, F. Peiró Monzó<sup>c</sup> y A. Muros Ortega<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Zona VIII. Albacete. <sup>b</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Zona IV. Albacete. <sup>c</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Zona I. Albacete.

### Resumen

**Descripción del caso:** Presentamos el caso de una mujer de 46 años sin antecedentes de interés, limpiadora de profesión, que consulta por lesiones pruriginosas en dorso de manos y a nivel interdigital de tres semanas de evolución. Refiere contacto mantenido con productos de limpieza, sin uso de guantes.

**Exploración y pruebas complementarias:** A la exploración, presenta placas eritemato-eczematosas en dorso de manos junto a vesículas interdigitales con sobreinfección en superficie. Se inició tratamiento con pimecrolimus 10 mg/g cada 24 horas, sin apreciar mejoría, por lo que se realizó interconsulta a Dermatología. Tras descartar un eccema alérgico de contacto mediante la realización de pruebas epicutáneas, se decidió iniciar tratamiento tópico con propionato de clobetasol 0,5 mg/g cada 24 horas, ácido fusídico, fomentos con sulfato de zinc 1/1.000 y uso de guantes para evitar el contacto con productos irritantes. Tras dos semanas de tratamiento, se objetivó una resolución completa de las lesiones.

**Juicio clínico:** Eccema dishidrótico.

**Diagnóstico diferencial:** Dermatitis de contacto alérgica, dermatitis atópica.

Ante los hallazgos clínicos, los antecedentes de exposición, la negatividad de las pruebas epicutáneas y la ausencia de antecedentes atópicos, el diagnóstico orienta a un eccema dishidrótico de causa irritativa.

**Comentario final:** El eccema de manos, causa más frecuente de dermatosis de contacto ocupacional (40%), es una condición que habitualmente presenta un curso crónico y recidivante. El factor más importante en el manejo de la dermatitis de contacto irritativa es la identificación del agente irritante. La localización más frecuente implica zonas de piel fina o áreas cubiertas. Una variante es el eccema dishidrótico, caracterizado por pápulas y vesículas pruriginosas, que comienzan a nivel interdigital y pueden extenderse al dorso de las manos. El tratamiento consta de varias fases: evitar el agente irritante, el uso de corticoides tópicos de potencia media alta y el uso de medidas físicas (guantes de algodón).

## **Bibliografía**

1. Lakshmi C, Srinivas CR. Hand eczema: an update. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2012;78:569-82.
2. Longo DL, Fauci AS, Kasper DL et al. Harrison Principios de Medicina Interna, 18ª ed. España: McGraw-Hill, 2012.
3. English J. Current concepts of irritant contact dermatitis. Occup Environ Med. 2004;61:722-6.

**Palabras clave:** *Eccema. Contacto. Atopia. Dishidrosis.*