



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/661 - EXPERIENCIA CON OXICODONA/NALOXONA EN PACIENTE CON DOLOR CRÓNICO EN ATENCIÓN PRIMARIA

F. Mata Canela^a, S. Cinza Sanjurjo^b, R.M. Martín González^c, R. Castillo Rubio^d, J.L. Martínez Lázaro^e y M. Bellod Sempere^f

^aHospital Campo Grande. Valladolid. ^bMédico de Familia. Centro de Salud Porto do Son. Santiago de Compostela.

^cMédico de Familia. Consulta Privada Dra. Martín. Valencia. ^dHospital Arnau de Vilanova. Valencia. ^eMédico de

Familia. Centro de Salud Avenida de Sax. Elda. ^fMédico de Familia. Centro de Salud Petrel I. Elda.

Resumen

Objetivos: Evaluar la evolución del dolor, calidad de vida (CdV) y satisfacción de pacientes con dolor crónico moderado-intenso, atendidos en Atención Primaria, tras 3 meses en tratamiento con oxycodona/naloxona (OXN).

Metodología: Subanálisis de estudio observacional multicéntrico de 3 meses de seguimiento. Se analizaron 77 pacientes con dolor crónico moderado intenso (EVA0-10 \geq 4) en su primera consulta en Atención Primaria y tratados de forma mantenida con OXN. Se evalúa la evolución del dolor, la CdV y la satisfacción con el alivio del dolor. Cuestionarios: breve de dolor (BPI); EuroQoL-5D (CdV); satisfacción (NRS0-10 y cumplimiento de expectativas con el alivio del dolor).

Resultados: Mujeres 57,1%, edad media $64 \pm 12,9$ años. Dolor osteoarticular 97,1%, 3,9% paciente oncológico, con componente neuropático el 39,0%. Mejoría sustancial en alivio de dolor medio (ENV0-10) de los pacientes tratados con OXN: 6,0 basal vs 2,9 Mes 3 ($p < 0,001$), con un alivio del dolor medio del 51,6%. El 72,7% de los pacientes obtuvieron un alivio del dolor $\geq 30\%$ y el 61,0% un alivio del dolor $\geq 50\%$. Mejora media en la CdV de $0,4 \pm 0,2$ puntos (tarifa de estados de salud) en basal a $0,7 \pm 0,2$ puntos en Mes 3 ($p < 0,001$). El 87% de los pacientes estaban satisfechos con el control de su dolor y el 96% con el servicio en el que le atienden.

Conclusiones: Los pacientes con dolor crónico moderado-intenso en tratamiento mantenido con oxycodona/naloxona en los servicios de Atención Primaria, obtienen mejoría clínica significativa en el control de su dolor y en su CdV.

Palabras clave: Oxycodona/naloxona. Dolor crónico. Calidad de vida.