



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/1611 - FIBROMIALGIA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

J.Á. Marín Serral^a, M. Giménez Olmos^a, P. Carcelle Beltri^a, S. Renau Solaz^b, A. Uceda Riera^b, S. Murciano Martí^b, A. Riaño Montalvo^b, H. Tarabishi Marín^a, M.J. Sáenz Rodríguez^a y X.A. Landín Delgado^b

^aMédico de Familia; ^bMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Atención Primaria Deltebre. Tarragona.

Resumen

Objetivos: Estudiar las enfermedades asociadas a fibromialgia en nuestro entorno.

Metodología: Diseño: estudio descriptivo. Ámbito: Atención Primaria. Muestra: todos los pacientes diagnosticados de fibromialgia de 3 cupos de un Centro de Atención Primaria (38).

Resultados: Edad media: 58 años. Sexo: mujer 37 (97,4%). Tabaco: no fumador 24 (72,7%), exfumador 6 (18,2%), fumador 3 (9,1%). Enol: no enol 31 (96,9%), enol no de riesgo 1 (3,1%), enol de riesgo 0. Hipertensión (HTA): 17 (44,7%). Diabetes mellitus (DM): 6 (15,8%). Dislipemia (DL): 26 (70,3%). Obesidad: 18 (48,6%). Hipotiroidismo: 9 (23,7%). Enfermedades autoinmunes: 2 (5,3%). Depresión/ansiedad: 30 (81%). Otras enfermedades mentales: 2 (5,3%). Medicación dolor: 34 (89,5%). Medicación psiquiátrica 32 (86,5%).

Conclusiones: Destaca predominio importante del sexo femenino igual que en la bibliografía previa, un porcentaje elevado de dislipemia y un porcentaje elevado de depresión y/o ansiedad. Este estudio muestra una utilización alta de tratamiento farmacológico del dolor y tratamiento farmacológico psiquiátrico en los pacientes con fibromialgia.

Palabras clave: Fibromialgia. Atención Primaria.