



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 212/3100 - TRATAMIENTO Y OBJETIVOS EN DOLOR CRÓNICO

P. Sánchez Amador<sup>a</sup>, I. Llario Cuquerella<sup>b</sup>, M. López Blasco<sup>b</sup>, V. Peiró López<sup>c</sup> y M. Darocas Garrigues<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Enguera. <sup>b</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Villanueva de Castellón. Valencia. <sup>c</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ontinyent II. <sup>d</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud. Enguera.

### Resumen

**Objetivos:** Lo que queremos establecer en nuestro medio son la prevalencia del dolor crónico y las causas fundamentales que lo producen, así como las enfermedades correlacionadas. Asimismo queremos determinar que tratamientos utilizamos con nuestros pacientes, ya sean opciones farmacológicas o no.

**Metodología:** Estudio epidemiológico, observacional, transversal, analítico en condiciones de práctica clínica habitual. Datos extraídos de historia clínica electrónica Abucasis. Tamaño muestral 350 pacientes del área entre 18 y 99 años que han presentado o presentan Dolor crónico reflejado y diagnosticado. en la historia clínica en los últimos 5 años. Análisis de datos: Excel, SPSS.

**Resultados:** N = 350 pacientes, la media de edad entre los pacientes diagnosticados de dolor crónico se sitúa en torno a los 60 años de edad (máx. 95, min. 18). La media del número de consultas realizadas con el motivo de dolor crónico es de 7 consultas por pacientes y motivo en 5 años, siendo el mínimo de consultas por ese mismo motivo de 1 y un máximo de 90 consultas. Por lo tanto obtenemos que un 42% de los pacientes presenta un mal control del dolor. En cuanto al tratamiento: el fármaco más empleado para tratamiento de dolor crónico es el paracetamol 19%, bien solo bien en combinación con opioides menores como el tramadol 14%. Un 8.6% utilizan AINEs. Un 12% de los pacientes está en tratamiento con opioides, los más utilizados son fentanilo tanto por vía oral como transdérmica, tapentadol y oxicodona. Otros fármacos utilizados para el tratamiento del dolor crónico son pregabalina 7%, corticoesteroides 4%, en menor medida benzodiazepinas y antidepresivos como la amitriptilina. Las causas más frecuentes de dolor crónico no oncológico en nuestro medio son las causadas por trastornos osteomusculares estando la lumbalgia en el primer puesto.

**Conclusiones:** 1. El dolor crónico tiene gran prevalencia en nuestra área. 2. Son muchas las consultas de atención primaria por dolor o para control del mismo. 3. La mayoría de los pacientes controlan los síntomas con fármacos del primer y segundo escalón de la OMS, aunque un 12% de los pacientes está ya en el tercer escalón y utiliza los fármacos del primer escalón para las reagudizaciones.

**Palabras clave:** Dolor crónico. Analgesia.

1138-3593 / © 2016 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.