



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 212/3765 - TASA DE RESPUESTA Y PRINCIPALES MOTIVOS DE RECHAZO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN GENERAL DEL ÁREA SANITARIA DE TOLEDO EN EL ESTUDIO RICARTO

M.L. Rodríguez García<sup>a</sup>, G.C. Rodríguez Roca<sup>b</sup>, F.J. Alonso Moreno<sup>c</sup>, A. Segura Fragoso<sup>d</sup>, A. Villarín Castro<sup>e</sup>, G.A. Rojas Martelo<sup>f</sup>, J. Fernández Conde<sup>g</sup>, L. Rodríguez Padial<sup>h</sup>, J. Fernández Martín<sup>i</sup> y A. Menchén Herreros<sup>j</sup>

<sup>a</sup>Enfermera del Estudio Ricarto. Gerencia de Atención Primaria de Toledo. Toledo. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud La Puebla de Montalbán. Toledo. <sup>c</sup>Médico de Familia. Centro de Salud de Sillería. Toledo. <sup>d</sup>Médico de Familia. Instituto de Ciencias de la Salud. Talavera de la Reina. <sup>e</sup>Médico de Familia. Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria. Gerencia de Atención Primaria de Toledo. <sup>f</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. <sup>g</sup>Unidad Administrativa. Gerencia de Atención Primaria de Toledo. <sup>h</sup>Cardiólogo. Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo. <sup>i</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. SESCAM. Toledo. <sup>j</sup>Médico de Familia. Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo.

### Resumen

**Objetivos:** Conocer la tasa de respuesta (TR) y los principales motivos de rechazo en la participación de la población general del área sanitaria de Toledo en el estudio RICARTO (Riesgo CARDIOVASCULAR y eventos cardiovasculares en la población general del área sanitaria de Toledo).

**Metodología:** Estudio epidemiológico transversal realizado en población  $\geq 18$  años de Centros de Salud (CS) urbanos y rurales del Área Sanitaria de Toledo aleatorizada según tarjeta sanitaria (2011-2016). Se analizó la TR global del estudio a 31 de marzo de 2016 y las TR de los CS de Toledo capital (2 visitas a 4 centros urbanos), Polán, Argés, Mocejón, Olías del Rey, Nambroca y Mora. Se realizó un pilotaje en 193 individuos que declinaron participar para conocer los motivos de rechazo.

**Resultados:** Se analizaron 1.309 individuos (edad media  $48,6 \pm 15,8$  años, 55% mujeres) de 3.611 posibles (incluidos en la muestra). Se observó un 23,8% de hipertensión arterial, 23,2% de hipercolesterolemia, 8,1% de diabetes, 24,9% de tabaquismo y un 41,7% de sedentarismo. La TR global fue 36,3%. Los hombres fueron más respondedores (37,3%) que las mujeres (35,3%), sin hallarse diferencias significativas. El grupo de edad que mejor respondió fue el de 45-64 años (46,5%); la significación estadística de las TR por edad fue  $p < 0,001$ . Por localidades se obtuvieron las siguientes TR: Toledo capital 37,7%, Polán 42,4%, Argés 36,6%, Mocejón 39,3%, Olías del Rey 31,6%, Nambroca 22,9% y Mora 38,3%. El pilotaje (edad media  $48,1 \pm 16,5$  años, 52,3% hombres) mostró que las principales causas de rechazo fueron el horario de trabajo/estudios (37,1%), ya le controla otro médico (29,6%) y no interesa/no puede (26,0%).

**Conclusiones:** La TR global del estudio RICARTO es baja, siendo el grupo de edad de 45-64 años el más participativo. Los hombres en general responden mejor que las mujeres. Por grupos de edad, los hombres de 45-64 años son los más participativos y las mujeres con 65 o más años son las que

peor TR se observa en el estudio. El horario de trabajo/estudios es la principal causa de rechazo.

El estudio RICARTO (Riesgo CARDiovascular y eventos cardiovasculares en la población general del área sanitaria de TOledo) ha sido financiado por el Gobierno de Castilla-La Mancha mediante la convocatoria de Ayudas de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha a la investigación de Biomedicina y Ciencias de la Salud, nº de expediente PI- 2010/043.

**Palabras clave:** *Población general. Tasa de respuesta. Pilotaje. Rechazo.*