



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 212/874 - ¿TOS SIEMPRE EN RELACIÓN CON INICIO DE IECAS?

M.E. del Junco Rodríguez<sup>a</sup>, I. Cornet Pujol<sup>a</sup>, E. Bayard<sup>a</sup>, R. Jiménez Gómez<sup>b</sup>, M. de la Cruz Herrera<sup>c</sup>, A. Arana Madariaga<sup>c</sup>, P. Farràs Serra<sup>c</sup>, A. Arocas Bonache<sup>d</sup>, A.M. Serrano González Ep Koessler<sup>e</sup> y A. Gutiérrez Espinal<sup>f</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria; <sup>b</sup>Enfermero Residente de Medicina Familiar y Comunitaria; <sup>c</sup>Médico de Familia; <sup>d</sup>Enfermero. Centro de Atención Primaria de Súria. Barcelona. <sup>e</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Manresa-4. Manresa. <sup>f</sup>Endocrinólogo. Althaia Xarxa Assistencial de Manresa. Manresa.

## Resumen

**Descripción del caso:** Mujer de 57 años consulta por tos irritativa de predominio diurno de más de un mes de evolución. Como antecedentes destaca hipertensión de reciente diagnóstico y haber iniciado tratamiento con IECA. Refería molestias anterocervicales desde hacía años.

**Exploración y pruebas complementarias:** Constantes correctas. ACR: normal. ORL: Sin hallazgos significativos. Se palpa bocio tiroideo. Analítica: Hemograma, coagulación y bioquímica correctas. TSH 0,88, T4 libre 0,83. Radiografía de tórax: Masa mediastínica superior derecha. TAC tórax: Bocio gigante con prolongación endotorácica. Nódulo derecho 67 × 40 mm que llega hasta carina. Ecografía tiroides con punción: Diferentes nódulos tiroideos. PAAF benigna.

**Juicio clínico:** En un primer momento relacionamos la tos con la reciente toma de IECA y se retira el fármaco, tras lo cual continúa persistiendo la clínica. Ante el hallazgo de masa mediastínica en la radiografía de tórax se deriva a Unidad de Diagnóstico Rápido para completar estudio y al servicio de endocrinología. Se diagnostica a la paciente de bocio gigante endotorácico. Se decide intervención quirúrgica, estando posteriormente la paciente asintomática.

**Diagnóstico diferencial:** Infección viral autolimitada - Ingesta de IECAs. Asma. Bronquitis. Reflujo gastroesofágico. Secreción nasal posterior. Tabaco u otros irritantes. Bronquiectasias. Bronquitis eosinófila. Aspiración. Carcinoma broncogénico. Tumor mediastínico. Bocio tiroideo. Linfoma. Tos psicógena. Absceso pulmonar. Sarcoidosis. Tuberculosis.

**Comentario final:** La tos es un mecanismo de defensa que en condiciones patológicas puede ser síntoma de una enfermedad importante. Según su duración distinguimos entre tos aguda (menor a 3 semanas) relacionada con procesos infecciosos, tos subaguda (de 3 a 8 semanas) y tos crónica (más de 8 semanas), siendo la subaguda y la crónica tributarias de comienzo de estudio en atención primaria.

## Bibliografía

1. Hamdan AL, Jabour J, Azar ST. Goiter and laryngeal sensory neuropathy. International Journal Otolaryngology 2013;2013:765265.

2. Madison JM, Irwin RS. Cough: a worldwide problem. *Otolaryngol Clin North Am* 2010;43:1-13.
3. Benich JJ, Carek PJ. Evaluation of the patient with chronic cough. *Am Fam Physician*. 2011;84:887-92.
4. Holmes RL, Fadden CT. Evaluation of the patient with chronic cough. *Am Fam Physician*. 2004;69:2159-66.

**Palabras clave:** *Crónica. IECA. Hipertensión. Bocio.*