



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/220 - VALORACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE CITOLOGÍAS PATOLÓGICAS Y VARIABLES INDIVIDUALES

J. Sánchez Acevedo^a, J.L. Camacho Ibáñez^a, A. Vázquez Márquez^a y M. Pedreira Ortega^b

^aMédico de Familia; ^bMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mercedes Navarro. Sevilla.

Resumen

Objetivos: Valorar la relación entre las diferentes variables y la patología cervical. Evaluar resultados, aplicar, elaborar medidas preventivas individuales y/o colectivas, relacionadas con resultados.

Metodología: Estudio multicéntrico retrospectivo descriptivo sobre total de mujeres incluidas en proceso de cervix que mediante citología se detecta resultado citológico con tipo de patología cervical incluido en proceso 2015. Valoramos total de las citologías patológicas y mediante encuesta personalizada, posible relación entre diferentes variables personales (edad, edad de comienzo de relaciones, nº de relaciones, nº de parejas, con aparición de citologías patológicas).

Resultados: Total citologías realizadas en todos los Centros: 4.949. Patológicas/Grupos edad: 75. Diferenciadas por nº relaciones/año, nº parejas, edad comienzo relaciones: 55.

Conclusiones: La prevalencia de infección VPH parece asociada a- edad. Igualmente parece que prevalencia alta aparece en edades inmediatas inicio de relaciones sexuales, respondiendo patrón de comportamiento sexual de comunidad. En poblaciones donde número compañeros sexuales distintos/ocasionales es elevado, prevalencia puede ser elevada como: 15-30% entre 15-25 años de edad. Primer pico prevalencia va seguido por disminución marcada, en edades: 25-40 años, donde: detección viral estabilizada: 3-10%. Parece existir fracción prevalente interpretada como medida indirecta grupo mujeres portadoras crónicas de infección viral/grupo alto riesgo para progresión neoplásica. Algunas poblaciones, se observa segundo pico prevalencia posmenopáusicas: interpretación objeto investigación. Datos recogidos no permiten afirmar correlación directa entre -edad, edad comienzo de relaciones/nº parejas, a favor de mayor incidencia de patología cervical.

Palabras clave: VPH. Citología. Edad. Relaciones sexuales.