



## Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

### 212/1868 - ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL TABAQUISMO ENTRE MIR DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Y EL RESTO DE ESPECIALIDADES EN EXTREMADURA

M.Á. Fandiño Márquez<sup>a</sup>, A.M. Aragón Merino<sup>b</sup>, M. Turégano Yedro<sup>c</sup>, A. Bellido Maldonado<sup>d</sup>, M.J. Jurado Mancheño<sup>e</sup>, M. Hidalgo García<sup>d</sup>, J.A. Riesco Miranda<sup>f</sup> y D. Igual Fraile<sup>g</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria; <sup>g</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Manuel Encinas. Cáceres. <sup>b</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Zona Centro. Cáceres. <sup>c</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Jorge. Cáceres. <sup>d</sup>Médico Residente. Servicio de Neumología; <sup>f</sup>Médico Neumólogo. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. <sup>e</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Aldea Moret. Cáceres.

#### Resumen

**Objetivos:** Realizar una comparación de la prevalencia del hábito tabáquico entre los MIR de MFyC y los MIR del resto de especialidades de Extremadura en el año 2015.

**Metodología:** Realizamos un estudio epidemiológico descriptivo mediante cuestionarios anónimos autoadministrados sobre el consumo tabáquico entre los MIR de MFyC y del resto de especialidades en Extremadura. Analizamos variables: sexo, condición de fumador activo (FA), exfumador (EF) y nunca fumador (NF), que se recopilaron en una base de datos y se analizan mediante el programa estadístico SPSS.

**Resultados:** Realizamos 275 encuestas de las que 86 (31,27%) corresponden a MIR de MFyC y 189 (68,73%) al resto de especialidades. El porcentaje de FA es ligeramente mayor en MIR de MFyC que del resto de especialidades (17,44% y 16,93% respectivamente), al igual que los EF (11,63% y 8,46% respectivamente); siendo mayor los NF en el resto de especialidades (74,60% frente al 70,93% de MFyC). Preguntados si consideran el tabaquismo una enfermedad, el porcentaje de MFyC es mayor (77,90%) frente al resto de especialidades (68,78%).

**Conclusiones:** El porcentaje de FA y EF es mayor en MIR de MFyC que en el resto de especialidades. Los MIR de MFyC consideran el hábito tabáquico una enfermedad más frecuentemente que los MIR del resto de especialidades.

**Palabras clave:** Prevalencia. Tabaquismo. MFyC. Especialidades.