



242/1280 - FRACASO RENAL MULTIFACTORIAL

M. Acha Pérez^a, I. Estepa Crespo^a y C. de la Cruz Seris-Granier^b

^aMédico de Familia. Centro de Salud Algeciras Norte. Cádiz. ^bMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Algeciras Norte. Cádiz.

Resumen

Descripción del caso: Mujer de 85 años, independiente para las ABVD. No RAMC. Antecedentes personales: DM tipo II, HTA, poliartrosis. Tratamiento habitual: metformina, olmesartan/hidroclotiazida, omeprazol. Presenta caída accidental con traumatismo en región dorso-lumbar. Acude a su centro de salud por dolor a la deambulaci3n. Presenta dolor a la palpaci3n de zona lumbosacra, sin hematoma ni herida en zona de contusi3n. En radiografía de columna dorso lumbar no se observan fracturas. Se pauta como tratamiento domiciliario etoricoxib 30 mg/24h asociado a AINEs habituales, ya que segun refiere Ibuprofeno y paracetamol no le hacen ya efecto. Tras 4 días de tratamiento domiciliario es traída de nuevo a urgencias de centro de salud por presentar malestar general, v3mitos y disminuci3n de la ingesta oral, motivo por el que es derivada a urgencias de Hospital.

Exploraci3n y pruebas complementarias: Destaca palidez cutánea. Hipotensi3n de 80/50, taquicardia y bradipsiquia. Analíticamente se objetiva parámetros compatibles con insuficiencia renal oligoanúrica con acidosis metab3lica (cr 5,21, urea 156, pH 7,27).

Juicio clínico: Fracaso renal agudo oligoanúrico de origen multifactorial: bajo gasto por baja ingesta, AINEs y diuréticos, en límite de fase pre-renal a necrosis tubular aguda.

Diagn3stico diferencial: Deshidrataci3n. Nefrotoxicidad farmacol3gica. Necrosis tubular aguda.

Comentario final: La COX-2 es constitutiva de algunos 3rganos, como cerebro y riñ3n, por lo que el uso de fármacos inhibidores de COX-2 pueden alterar la funci3n de estos 3rganos. Específicamente en el riñ3n, estas alteraciones van a depender de la expresi3n de la COX-1 y la COX-2 en los distintos segmentos de la nefrona. En conclusi3n, los ICOX-2 pueden producir alteraciones importantes en la funci3n renal. Sus efectos adversos agudos son reversibles y se presentan, preferentemente, en situaciones clínicas asociadas a déficit de volumen extracelular y/o volumen efectivo -como la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis hepática, el síndrome nefr3tico, la sepsis- en pacientes ańosos, hipoalbuminémicos, con dańo renal previo y/o que reciben diuréticos y/o IECA.

Bibliografía

1. Fisiopatología de la ciclooxigenasa-1 ciclooxigenasa-2. Rev Esp Reumatol. 2000;27:33-5.
2. Aintiinflamatorios inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2. Alergol Inmunol Clin.

2002;17:247-54.

Palabras clave: Nefrotoxicidad. AINEs. Insuficiencia renal.