



## 242/3844 - ECOGRAFÍA CLÍNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA: ANEURISMA POPLÍTEO

S. Charro Alonso<sup>a</sup>, L. Rivera García<sup>b</sup> y R. Díaz Fernández<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud El Coto. Gijón. Asturias. <sup>b</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud El Llano. Gijón. Asturias. <sup>c</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Natahoyo. Gijón. Asturias.

### Resumen

**Descripción del caso:** Varón de 68 años, sano, deportista, jugador de fútbol retirado. Como antecedentes únicamente destaca prótesis de rodilla izquierda. Consulta por molestias en rodilla izquierda de tiempo de evolución, sin antecedente traumático, valorado por traumatólogo particular con radiografía normal y sin mejoría con analgesia.

**Exploración y pruebas complementarias:** Consciente, orientado. Buen estado general. Rodilla sin alteraciones excepto bultoma con latido a nivel de hueco poplíteo izquierdo. Pulsos conservados. Ecografía doppler: aneurisma poplíteo izquierdo de 4 cm.

**Juicio clínico:** Aneurisma poplíteo izquierdo.

**Diagnóstico diferencial:** Gonalgia de origen traumatológico. Gonartrosis. Quiste de Baker.

**Comentario final:** Los recursos en Atención Primaria pueden ser limitados, pero en muchas ocasiones suficientes para el día a día de nuestras consultas. En este caso, la capacidad del médico para manejar la ecografía clínica fue determinante en el diagnóstico del paciente y, en consecuencia, una derivación precoz a cirugía vascular para intervención del mismo.

### Bibliografía

1. Alonso Roca R, Díaz Sánchez S. Utilización de la ecografía en atención Primaria. Revista de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria. 2012;14:28-30.
2. Figueroa G, Pereira M, Campos A, Moreno JP, Rivera N, Moraga M. Aneurisma Arteria Poplíteo. Rev Chil Cir. 2014;66(5):486-8.

**Palabras clave:** Rodilla. Aneurisma. Ultrasonografía.