



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

## 347/1569 - PANCREAS DIVISUM COMO CAUSA DE ABDOMINALGIA CRÓNICA Y PANCREATITIS AGUDA

L. Hurtado Rebollo<sup>a</sup>, M. Pérez Garrachón<sup>b</sup>, S. Manso García<sup>c</sup> y M. Moya de la Calle<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Barrio España. Valladolid. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Canterac. Valladolid Este. <sup>c</sup>Médico de Familia. Especialista en Radiología. Valladolid. <sup>d</sup>Médico de Familia. Servicio de Urgencias. Hospital Río Hortega. Valladolid.

### Resumen

**Descripción del caso:** Varón de 59 años, no fumador ni consumidor de alcohol. Antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, hiperuricemia. En estudio por presentar abdominalgia crónica localizada en epigastrio desde hace 8 meses.

**Exploración y pruebas complementarias:** Exploración normal salvo dolor epigástrico a la palpación. Ecografía en el Centro de Salud sin hallazgos significativos. Se deriva a digestivo para completar estudio y se realiza: fibrogastrocopia: gastritis crónica. Nueva ecografía abdominal: normal. Por la persistencia de la abdominalgia intermitente, presencia de pérdida de peso y aumento de amilasa (274 U/l) y lipasa (187 U/l) aislado sin otras alteraciones. Se solicita colangiopancreatografía-resonancia magnética (CPRM) en la que se diagnostica presencia de páncreas divisum y signos leves de pancreatitis aguda asociada.

**Orientación diagnóstica:** Pancreatitis aguda. Páncreas divisum. Abdominalgia crónica.

**Diagnóstico diferencial:** Pancreatitis aguda y crónica, carcinoma pancreático.

**Comentario final:** El páncreas divisum es la anomalía congénita más frecuente que afecta al 4 al 10% de la población según las series. Se caracteriza por la falta de fusión embrionaria de las porciones dorsal y ventral que provoca la existencia de dos glándulas separadas. Frecuentemente asintomático pero puede ser causa de dolor abdominal crónico y pancreatitis. Aunque en recientes publicaciones se cuestiona como causa de pancreatitis, habiendo controversia respecto a su significado. El diagnóstico normalmente se realiza por colangioCPRM. o CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica). Tratamiento conservador y si ocasionan pancreatitis recidivante puede precisar esfinterotomía

### Bibliografía

1. Rumack CM, Wilson S, Charboneau J, et al. Diagnóstico por Ecografía, 4<sup>a</sup> ed. Madrid: Marban; 2014. p. 198-203.
2. Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, et al, eds. Harrison Principios de Medicina Interna, 18<sup>a</sup> ed. México: McGraw-Hill; 2012.

3. Fernández-Rodríguez A, Segura-Grau A. Rodríguez-Lorenzo J.M. Segura-Ecografía pancreática. SEMERGEN. 2015;41:158-63.

**Palabras clave:** Pancreas divisum. Pancreatitis. Abdominalgia crónica.