



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

## 347/4615 - INDICACIÓN DE ANTICOAGULACIÓN EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR (FANV) ANTICOAGULADOS CON ACENOCUMAROL

M. Ferrus Domingo<sup>a</sup>, A. Núñez Villén<sup>b</sup>, P. Frías Ruiz<sup>c</sup>, M. Lara Moyano<sup>d</sup>, I. Subirats Edo<sup>d</sup>, G. Ana<sup>e</sup>, D. Lumbreras Manjón<sup>b</sup>, M. Cabezuelo Barber<sup>b</sup>, E. Bajo Sánchez<sup>d</sup> y M. Iturbide Pérez<sup>f</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de 1<sup>er</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Valencia. <sup>b</sup>Médico Residente de 4<sup>o</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Valencia. <sup>c</sup>Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria. Centro de Trabajo Genesiscare. Jerez de la Frontera. <sup>d</sup>Médico Residente de 3<sup>er</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Valencia. <sup>e</sup>Médico Residente de 2<sup>o</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Valencia. <sup>f</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Valencia.

### Resumen

**Objetivos:** Determinar la indicación de anticoagulación mediante escalas validadas en pacientes anticoagulados con acenocumarol con diagnóstico de FANV.

**Metodología:** Estudio observacional transversal incluye a pacientes anticoagulados con acenocumarol diagnosticados de fibrilación auricular no valvular (FANV) hace más de 6 meses y que se disponga de al menos 6 determinaciones de INR realizadas en el centro de salud a lo largo del mes de julio de 2018. Se recogen variables demográficas y de comorbilidades que consten en historia clínica electrónica. Se utilizan escalas validadas para establecer el riesgo de ictus, CHADS y CHA2DS2VASC. Se considera indicado si la puntuación es  $\geq 2$  en cualquiera de las 2 escalas.

**Resultados:** Se obtienen 223 pacientes. La media de edad es  $77,55 \pm 9,21$ . El 66,4% son de 75 años o más. Se estima el riesgo de ictus mediante la escala CHADS, 79,4% sujetos presentan una puntuación  $\geq 2$  puntos ( $n = 177$ ). La determinación mediante la escala CHA2DS2VASC 96,9% ( $n = 216$ ) presenta puntuación  $\geq 2$  puntos.

**Conclusiones:** El 20,6% no presenta indicación de anticoagulación mediante la escala CHADS. El 3,1% no presenta indicación calculada por la escala CHA2DS2VASC. La escala CHA2DS2VASC presenta más sensibilidad para la indicación de anticoagulación que la CHADS.

**Palabras clave:** Fibrilación auricular. Indicación. Anticoagulación.