



Medicina de Familia. SEMERGEN

<http://www.elsevier.es/semergen>



424/147 - LA DEPRESIÓN EN LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

M. Biendicho Palau¹, T. Alonso Sancho¹, M. Torres Moliné², L. Villalba Cortes³, R. Marco Carmona³, J. Pujol Salud¹ y F. Reventoz Martínez⁴

¹Médico de Familia. Centro de Asistencia Primaria de Balaguer. Lleida. ²Médico de Familia. Centro de Asistencia Primaria de Agramunt. Lleida. ³Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro Asistencia Primaria de Balaguer. Lleida. ⁴Médico de Familia. Centro de Asistencia Primaria Balaguer. Lleida.

Resumen

Objetivos: Valorar el efecto de la depresión en pacientes que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Metodología: En una muestra aleatoria simple de 19 pacientes de EPOC de nuestro centro. Se les realizó una espirometría forzada y administró el test de calidad de vida Saint George, (SGRQ), Hamilton de depresión y Charlson de comorbilidad. Analizando estadísticamente los resultados. Estudio descriptivo transversal.

Resultados: La edad media de los pacientes todos varones fue de $75,89 \pm 5,14$, el volumen espiratorio máximo en un segundo (FEV1) $53,17 \pm 20,15$, SGRQ $44,97 \pm 18$, H. depresión $10,68 \pm 12$. La correlación de Pearson entre la calidad de vida SGRQ y la depresión medida por el test de Hamilton, fue de 0,526, la correlación entre FEV1 y SGRQ fue de 0,501 y entre FEV1 y depresión fue de 0,001.

Conclusiones: En nuestro estudio la mayor puntuación en el test de Hamilton sobre depresión, guarda cierta correlación con una peor calidad de vida y no guarda correlación con la obstrucción al flujo aéreo FEV1.

Palabras clave: EPOC. Depresión.