



Medicina de Familia. SEMERGEN

<http://www.elsevier.es/semergen>



482/554 - POLIFARMACIA EN PACIENTES FRÁGILES, ¿UNA MALA PRAXIS?

P. Barboza Trujillo¹, Y. Avellaneda López² y C. Palomar Muñoz³

¹Residente de 3^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Algeciras-Norte. Algeciras. Cádiz.

²Residente de 5^o año de Medicina Interna. Hospital Punta de Europa. Algeciras. Cádiz. ³Especialista en Medicina Interna. Hospital Puerta del Mar. Cádiz.

Resumen

Descripción del caso: Mujer 70 años que presenta astenia, mialgias y pérdida de fuerza de miembros inferiores y zona proximal de los superiores. No refiere otra sintomatología asociada. No alergias medicamentosas. Hipertensa, diabética tipo 2 y dislipemia. Carcinoma de mama con metástasis óseas. Fibrilación auricular paroxística. Estenosis mitral reumática grave. Tratamiento actual: palbociclib, amiodarona, bisoprolol, simvastatina, canaglifozina.

Exploración y pruebas complementarias: ECOG 1. SpO₂ 99%. TA 160/70 mmHg. FC 60 lpm. Consciente, orientada y colaboradora. Normohidratada y normoperfundida. Eupneica en reposo. AC: Tonos arrítmicos con soplo sistólico panfocal. MMII: edemas con fovea hasta rodillas bilateral. Neuro: fuerza en MMII (3/5), fuerza MMSS (4+/5). Sensibilidad superficial y profunda conservada. Sin otras alteraciones neurológicas. Resto sin alteraciones destacables. Hemograma: normal. Coagulación: INR 3,77; fibrinógeno 484 mg/dl, TP 43,7 segundos. Bioquímica: creatinina 1,7 mg/dl, urea 129 mg/dl, GOT 1.088 U/L, GPT 723 U/l, GGT 132 U/l, fosfatasa alcalina 94 U/l, bilirrubina total 0,77 mg/dl, LDH 2.006 U/l, CK 22.741 U/l, aldolasa 104 U/l, resto de parámetros bioquímicos dentro de la normalidad. Serología VHA, VHB, VHC, VIH, CMV negativos. VEB IgG positivo. Estudio de autoinmunidad: ANA, Ac anti-Jo-1, Ac anti-PMScl, Ac anti-Ku, ac anti-Mi-2 negativos. Ac antimitocondriales 1/160. RX tórax: cardiomegalia con signos de redistribución vascular sin otras alteraciones.

Orientación diagnóstica: Se inicia hidratación y se suspenden palbociclib, amiodarona y simvastatina por sospecha de hepatitis aguda y rabdomiolisis como efecto secundario de la interacción farmacológica. Dicha sospecha se confirma tras hallazgo de las pruebas complementarias. Evolucionó de forma favorable normalizando nivel de transaminasas, CK y LDH y función renal y recuperando fuerza en MMII, siendo capaz de deambular sin incidencias.

Diagnóstico diferencial: Polimialgia reumática. Rabdomiolisis. Miopatía corticoidea.

Comentario final: Tanto el palbociclib como la amiodarona y la simvastatina se metabolizan por la vía del CYP3A4, por lo que al administrarlos de forma conjunta hace que se potencien los efectos secundarios, entre los que destacan la rabdomiolisis y la hepatitis. Debemos tener siempre en cuenta los fármacos administrados, ya que pueden ser la etiología de diferentes síntomas y síndromes.

Bibliografía

1. Salvador-Carulla L, Cano Sánchez A, Cabo-Soler JR. Longevidad, Tratado integral sobre la salud en la segunda mitad de la vida. Panamericana, 2004.

Palabras clave: Polifarmacia. Rabdomiólisis.