



Medicina de Familia. SEMERGEN

<http://www.elsevier.es/semergen>



482/392 - LA DESNUTRICIÓN EN PACIENTES ANCIANOS ASOCIADO A LA DISFAGIA

A. González Andreu¹, Y. González Lugo², Y. Avalos Fernández³ y A. González Pérez⁴

¹Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Icod. Icod de los Vinos. Santa Cruz de Tenerife. ²Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Los Realejos. Santa Cruz de Tenerife. ³Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Los Realejos. Los Realejos. Santa Cruz de Tenerife. ⁴Enfermera. Centro de Salud Los Realejos. Los Realejos. Santa Cruz de Tenerife.

Resumen

Descripción del caso: La disfagia y la desnutrición son afecciones que frecuentemente aparecen juntas, si existe un trastorno de deglución puede tener dificultad o dolor al tragar líquidos, alimentos o saliva, esto hace que sea difícil de comer, puede ser difícil ingerir suficientes calorías y líquidos para nutrir su cuerpo, siendo más común en el adulto mayor. La acción para prevenir e identificar tempranamente la desnutrición es un método utilizado en atención primaria, así como el manejo del apoyo nutricional y acciones para evaluar el cumplimiento y la eficacia del tratamiento. Se recomienda un enfoque de equipo multidisciplinario para promover una mejor comunicación y calidad de la atención. Paciente femenina de 74 años de edad, que reside en su domicilio habitual, con antecedentes de artritis reumatoide, depresión mayor, y enfermedad de Alzheimer. Desde hace 3 meses viene presentando dificultad al tragar, anorexia, pérdida de peso, mayor dependencia para las actividades de la vida diaria, y agitación psicomotriz asociado a insomnio frecuente.

Exploración y pruebas complementarias: Desorientación temporo-espacial, deterioro cognitivo, palidez cutánea mucosa. Cavidad oral: ausencia total de piezas dentarias. Parámetros antropométricos: peso 56 kg, talla 160 cm IMC: 21,87 Kg/m², pantorrilla: 26 cm, perímetro braquial: 24 cm. Analíticas de control: proteínas totales 5,1 g/dL, albúmina 2,4, colesterol total: 90 mg/dL, creatinina: 0,60 mg/dl, glucemia 109 mg/dL.

Orientación diagnóstica: Desnutrición mixta.

Diagnóstico diferencial: Enfermedades malignas, enfermedades musculo esqueléticas, procesos nefrogeriátricos, sarcopenia, caquexia.

Comentario final: La Disfagia ha conllevado a mayor deterioro del estado nutricional. El IMC indica peso insuficiente para su sexo y edad, así como la antropometría depleción severa de la masa muscular y grasa. Ingestas irregulares por la pérdida total de las piezas dentales. En los resultados analíticos existe una disminución del valor proteico y calórico. Conducta a seguir: valoración por especialista en nutrición para mejor proceder y tratamiento con suplemento nutricional. Destacamos la importancia de este caso dada la gran cantidad de pacientes de edad avanzada y con desnutrición que atendemos a diario en las consultas de atención primaria.

Bibliografía

1. Morley JE. Nutrition and the brain. Clin Geriatr Med. 2010;26:89-98.

Palabras clave: Desnutrición. Anciano. Disfagia.