




Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

P-016 - RESOLUCIÓN POR TELEDERMATOLOGÍA EN LESIONES PIGMENTARIAS

B. Muñoz Díaz, R. Escuder Egea, M. Lobo Marin, S. Ruiz Rejano, J. Redondo Sánchez y J. Martínez de la Iglesia CS Lucano.

Resumen

Objetivos: Evaluar la utilización de teledermatología en lesiones pigmentarias en las consultas de atención primaria.

Metodología: Estudio descriptivo, observacional, en una muestra de 200 pacientes para teledermatología diferida. Se realiza fotografía que es enviada por correo electrónico a especialista en dermatología, el cual confirma diagnóstico y necesidad de derivación y/o tratamiento más adecuado. Las variables medidas son la edad, el sexo, juicio clínico de atención primaria, tiempo de respuesta por dermatólogo, juicio clínico por dermatología, concordancia, tratamiento, número de visitas al dermatólogo y tiempo total. Estadística SPSS descriptiva para medias y frecuencias e índice de kappa para concordancia.

Resultados: Se ha obtenido una media de edad de 57 años (± 22), siendo el 61% mujeres, el tiempo medio de espera en obtención de respuesta dermatológica de 1,3 ($\pm 1,8$) días. Los diagnósticos hallados con mayor frecuencia es el de nevus en un 23,7% de los pacientes, basocelular 21,1%, queratosis seborreica 16,5% y espinocelular 14,5%, melanoma 2,1%. Teniendo en cuenta la concordancia de diagnósticos se ha obtenido un índice de Kappa de 0,7. Se ha precisado derivación a dermatología en 55,7% de los pacientes. Tratamiento quirúrgico 33%. El tiempo total medio para la resolución del cuadro han sido unos 61 (± 80) días.

Conclusión: Consideramos que telederma en las consultas de atención primaria es una herramienta muy útil para diagnosticar de forma rápida lesiones pigmentarias dudosas o malignas, así como para disminuir derivaciones innecesarias a dermatología.