



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

253/5 - LA IMPORTANCIA DE CONOCER EN CONJUNTO A PACIENTES Y SUS ENFERMEDADES

K. Baldeón Cuenca^a, M. García Aroca^b, A. Nofan Maayah^c, J. Bustamante Odriozola^d, N. San Miguel Martín^e, M. Santos Gravalosa^e, M. Abuhassira^f, V. Choquehuanca Núñez^g, L. Cotruta^h y V. Ovejero Gómezⁱ

^aMédico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Besaya. Torrelavega. ^bMédico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Los Dolores. Cartagena. Murcia. ^cMédico de Familia. Centro de Salud Laredo. Cantabria. ^dMédico Residente de 1º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Isabel II. Santander. ^eMédico de Familia. Centro de Salud Aranda Norte. Burgos. ^fMédico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Castilla. Santander. ^gMédico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Isabel II. Santander. ^hMédico Residente de 2º año de Cirugía General. Hospital Sierrallana. Cantabria. ⁱMédico Adjunto Servicio Cirugía general. Hospital Sierrallana. Cantabria.

Resumen

Descripción del caso: Mujer de 28 años con enfermedad de Von Hippel-Lindau. Diagnóstico establecido por la presencia de hemangioblastoma retiniano bilateral (intervenida quirúrgicamente a los 10 años de edad con pérdida de visión completa en ojo izquierdo), quistes pancreáticos múltiples, y análisis genético-molecular positivo (siendo portadora de la mutación familiar). En seguimiento por Atención Primaria desde hace doce años, Oftalmología desde hace dieciocho y Digestivo desde hace cuatro. Cinco años antes acudió a Neurología realizándose TC-craneal que fue informado como normal, siendo dada de alta posteriormente. La paciente acude a su médico de Atención Primaria tras haber precisado atención en el Servicio de Urgencias de su hospital de referencia en otras tres ocasiones en los últimos dos meses, por presentar mareos, náuseas, vómitos y alteración del equilibrio, habiendo sido tratada de vértigo periférico con sulpiride sin presentar mejoría, sino empeoramiento de los síntomas. Dado su antecedente personal de Von Hippel-Lindau su médico decide derivarla inmediatamente al hospital para realizar una prueba de imagen que descarte patología intracraneal.

Exploración y pruebas complementarias: En la consulta de Atención Primaria: TA: brazo derecho 114/80, brazo izquierdo 118/76. Cabeza y cuello: leucocoria izquierda. Movilidad del cuello con limitación a la extensión. Auscultación cardiopulmonar: normal. Abdomen: normal. Extremidades inferiores: normales. Exploración neurológica: pares craneales normales. No nistagmus. Romberg negativo. En el hospital: Analítica: normal. TAC cerebral con contraste: imágenes sugestivas de hemangioblastomas en fosa posterior e intrarraquídeo, el mayor en hemisferio cerebeloso derecho, con efecto expansivo que genera herniación transtentorial e hidrocefalia supratentorial.

Juicio clínico: Enfermedad de Von Hippel-Lindau con hemangioblastomas cerebelosos de reciente diagnóstico.

Diagnóstico diferencial: Vértigo periférico (vértigo postural paroxístico benigno, enfermedad de Ménière, laberintitis, colesteatoma, neurinoma del acústico) y vértigo central (isquemia cerebelal, migraña basilar, tumor ángulo ponto-cerebeloso, infecciones del sistema nervioso central).

Comentario final: Es necesario conocer que la enfermedad de Von Hippel-Lindau se asocia a hemangioblastomas de retina y cerebelo principalmente, al hemangioblastoma espinal, a feocromocitoma y carcinoma de células renales. Su diagnóstico depende de la aparición de tumores múltiples y la principal causa de muerte es el carcinoma de células renales y hemangioblastomas de sistema nervioso central. Es importante hacer un seguimiento regular de los pacientes afectados para una detección precoz y tratamiento de los tumores que reduzca la morbilidad y mortalidad. Gracias al manejo multidisciplinar coordinado entre el médico especialista de Atención Primaria y especialistas hospitalarios se pudo sospechar rápidamente que la clínica que sufría la paciente podía ser secundaria a su enfermedad y así derivarla a cirugía que es la base del tratamiento de los tumores.

Bibliografía

1. Wanebo JE, et al. The natural history of hemangioblastomas of the central nervous system in patients with von Hippel-Lindau disease. *J Neurosurg.* 2003;98:82-94.
2. Richard S, Lindau J, Graff J, Resche F. Von Hippel-Lindau disease. *Lancet.* 2004;63:1231-4.

Palabras clave: Von Hippel-Lindau.