




# Neurology perspectives



## 18513 - EFICACIA Y TOLERABILIDAD DE CENOBAMATO EN EPILEPSIA FOCAL FARMACORRESISTENTE EN PRÁCTICA CLÍNICA

*Machío Castelló, M.; G Giráldez, B.; Serratosa, J.M.*

*Servicio de Neurología. Fundación Jiménez Díaz-Ute.*

### Resumen

**Objetivos:** Valorar la eficacia y tolerabilidad de cenobamato (CNB) como terapia añadida en adultos con epilepsia focal farmacorresistente.

**Material y métodos:** Estudio observacional retrospectivo en pacientes que recibieron al menos una dosis de CNB. Se analizaron las tasas de respondedores (> 50 y > 90%), libertad de crisis y tasas de retención (TR) a los 6 y 12 meses. La tolerabilidad se evaluó a los 3 y 6 meses.

**Resultados:** Incluimos 51 pacientes. Duración media de la epilepsia: 12,9 años; frecuencia media basal (3 meses): 24,5 crisis/mes; medicamentos anticrisis previos 8 y concomitantes 3; dosis media CNB: 251 mg/día (100-400 mg/día). A 6 meses, las tasas de respondedores > 50% y > 90% fueron 41,2% (14/34) y 20,6% (7/34) y 1/34 estaba libre de crisis. TR 6 meses: 85% (34/40). A 12 meses, las tasas de respondedores > 50% y > 90% fueron 46,7% (7/15) y 33,3% (5/15) y ninguno estaba libre de crisis. TR 12 meses: 75% (15/20). Durante los primeros 3 meses, 66% (34/51) tuvieron efectos adversos (EA) y durante el periodo de 6 meses 88% (30/34). Los EA más frecuentes fueron somnolencia e inestabilidad. Solo un paciente tuvo *rash* cutáneo. Diez pacientes abandonaron CNB (4 por EA, 3 por falta de eficacia y 3 por ambas causas).

**Conclusión:** En condiciones de práctica clínica, CNB como terapia añadida fue eficaz en pacientes con epilepsia focal farmacorresistente. En solo un 13,7% de los pacientes se retiró el fármaco por falta de tolerabilidad.