



Neurology perspectives



17525 - COMPARACIÓN POR GÉNEROS EN CASOS DE ICTUS ISQUÉMICOS AGUDOS SOMETIDOS A TROMBECTOMÍA MECÁNICA

Sosa Cabrera, Y.¹; Medina Rodríguez, A.¹; Rodríguez Baz, Í.²; Ríos Cejas, M.D.R.¹

¹Servicio de Neurología. Hospital Nuestra Señora de Candelaria; ²Servicio de Neurología. Clínica Parque, S.A.

Resumen

Objetivos: Analizar las diferencias y los resultados clínicos entre hombres y mujeres con ictus isquémicos agudos tratados mediante trombectomía mecánica.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo en los ictus isquémicos agudos sometidos a trombectomía mecánica desde 2012 a 2021 en un hospital terciario. Se compararon las características clínicas, así como diagnósticas y terapéuticas, según los pacientes fueran hombres o mujeres.

Resultados: Se incluyeron 334 pacientes, siendo el 47,7% mujeres. La edad media en el grupo femenino fue $71,2 \pm 13,7$ años frente a $64,6 \pm 13$ años en los varones. Estos últimos presentaron tasas más altas de tabaquismo (72,2%) y hábito enólico (89,3%), mientras que el 58,4% de las mujeres presentaron fibrilación auricular ($p < 0,005$). Casi el 90% de este último grupo presentó un ictus total de circulación anterior, mientras que solo en 5 casos los ictus fueron de circulación posterior ($p < 0,05$). Se encontraron diferencias significativas en la etiología del ictus; la aterotrombótica e inhabitual fueron más frecuentes en los hombres (70,4 vs. 2,6 y 66,7 vs. 33,3%, respectivamente), siendo la cardioembólica superior en mujeres (55,3 vs. 44,7%). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el resto de variables estudiadas.

Conclusión: En nuestra muestra encontramos diferencias entre géneros en la edad de presentación, tabaquismo, hábito enólico y etiología de los ictus, sin hallar diferencias en los resultados funcionales a los 90 días.