



Neurology perspectives



19893 - NEURALGIA DEL GLOsofaríngeo CLÁSICA: A VECES ES MEJOR MANTENER LAS DISTANCIAS

Villarreal Miñano, J.¹; Bea Sintés, M.¹; Lombardo del Toro, P.¹; Angerri Nadal, M.¹; Valín Villanueva, P.¹; Castell Aulet, J.²; Cifra Serra, J.³; Sanmillán Blasco, J.³; Velasco Fargas, R.¹; Arroyo Pereiro, P.¹; Martínez Yélamos, A.¹; Martínez Yélamos, S.¹; Prat Rojo, J.¹; Campoy Díaz, S.⁴; Huerta Villanueva, M.⁴; Muñoz Vendrell, A.¹

¹Servicio de Neurología. Hospital Universitari de Bellvitge; ²Servicio de Neurorradiología. Hospital Universitari de Bellvitge; ³Neurocirugía. Hospital Universitari de Bellvitge; ⁴Servicio de Neurología. Hospital de Viladecans.

Resumen

Objetivos: La neuralgia del glossofaríngeo es una entidad poco frecuente y, aunque por su similitud clínica y fisiopatológica con la del trigémino se usan los mismos tratamientos, la evidencia es más escasa especialmente de cara al tratamiento quirúrgico.

Material y métodos: Mujer de 65 años, presenta cuadro de dolor neurálgico intraauricular derecho de 7 años de evolución de forma intermitente, alternados con períodos de remisión, y empeoramiento desde hace 6 meses. El dolor es lancinante, quemante, comienza limitado a conducto auditivo externo (CAE) derecho y se irradia hacia región superior del hemipaladar derecho (no afecta lengua ni territorio trigeminal); de pocos segundos de duración, alterno con crisis intensas de mayor duración, con período refractario de pocos segundos. Desencadenado con la deglución, masticar, hablar, movimientos cervicales y en ocasiones al tacto sobre CAE. Niega náuseas, vómitos o fobia a estímulos. No síntomas trigeminoautonómicos. Niega mareos, bradicardia o infecciones auriculares. No otra focalidad asociada. El estudio de neuroimagen inicial fue normal. Probó tratamientos con carbamazepina, oxcarbacepina, lacosamida, eslicarbacepina, baclofeno y clonazepam con mala respuesta y evolución que requirió ingreso.

Resultados: Se repitió resonancia magnética cerebral y arteriografía que mostró contacto neurovascular del IX pc derecho con la PICA derecha, provocando un desplazamiento del nervio. Se procedió a realizar descompresión neurovascular, con muy buena respuesta para el control del dolor y permitiendo la desescalada progresiva de fármacos.

Conclusión: A pesar de que existe menor evidencia en la literatura sobre la cirugía de la neuralgia del glossofaríngeo clásica, la descompresión microvascular es probablemente una técnica eficaz y recomendada.