



# Neurology perspectives



## 19926 - Ofatumumab en la práctica clínica habitual para el tratamiento de la esclerosis múltiple: análisis de los primeros pacientes tratados en Galicia

García de Soto, J.<sup>1</sup>; Pouso Diz, J.<sup>1</sup>; Sempere Navarro, C.<sup>1</sup>; González Suárez, I.<sup>2</sup>; Costa Arpín, E.<sup>3</sup>; Pato Pato, A.<sup>4</sup>; Rodríguez Regal, A.<sup>5</sup>; Lorenzo González, J.<sup>6</sup>; Alberte Woodward, M.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Servicio de Neurología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago; <sup>2</sup>Servicio de Neurología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo; <sup>3</sup>Servicio de Neurología. Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Prof. Novoa Santos; <sup>4</sup>Servicio de Neurología. Complejo Hospitalario Universitario de Ourense; <sup>5</sup>Servicio de Neurología. Hospital Montecelo; <sup>6</sup>Servicio de Neurología. Hospital Povisa.

### Resumen

**Objetivos:** Evaluar la efectividad y los efectos adversos de ofatumumab en una cohorte de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente de Galicia.

**Material y métodos:** Analizamos la edad, sexo, EDSS, la tasa anualizada de brotes, lesiones en T2 y lesiones con captación de gadolinio, el número de tratamientos previos, el motivo y forma de cambio en pacientes tratados con ofatumumab en los diferentes hospitales gallegos, tanto basalmente como a los 6 meses.

**Resultados:** Hasta el momento se han recogido datos de 15 pacientes. De los 10 pacientes que han iniciado el tratamiento hasta la fecha, 8 son mujeres. La media de edad es de 40,6 años. Al inicio del tratamiento la mediana de EDSS es 2 (rango 0-3, 5), la mediana de la tasa anualizada de brotes es de 1 (rango 0-2). 13 pacientes (86,7%) habían recibido tratamiento previo, siendo fingolimod el más frecuente (26,7%). 5 pacientes (33,3%) tenían más de 30 lesiones en T2. En 2 pacientes (28,6%) se demuestra alguna lesión captante de gadolinio. Ningún paciente ha experimentado reacciones adversas significativas. Tras 6 meses se evaluarán de nuevo las variables clínicas y radiológicas.

**Conclusión:** Los registros de práctica clínica real suponen una oportunidad para profundizar en el conocimiento del perfil de eficacia y seguridad de fármacos de reciente introducción e informan sobre cuestiones no evaluadas en ensayos clínicos, como es el tiempo de lavado en cambios de tratamiento.