



Neurology perspectives



19152 - FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A UN DESENLACE NEGATIVO EN PACIENTES CON ESTATUS EPILEPTICO ATENDIDOS EN UN HOSPITAL COMARCAL

Mandr  Noya, M.¹; Martha Gonz lez, A.²; Moreira Suarez, Y.³; Esteve Belloch, P.¹; Escalante Arrollo, S.¹; Martin Ozaeta, G.¹; Payo Froiz, I.¹; Espinoza Trujillo, A.¹; Rodrigo Stevens, G.¹; Concha Mart nez, P.⁴; Franch Llasat, D.⁴; Zaragoza Brunet, J.¹

¹Servicio de Neurolog a. Hospital Verge de la Cinta de Tortosa; ²Servicio de Geriatr a. Hospital Verge de la Cinta de Tortosa; ³ Servicio de Medicina Interna. Hospital Verge de la Cinta de Tortosa; ⁴Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Resumen

Objetivos: En este estudio analizamos las variables asociadas a una evoluci n desfavorable en el estatus epil ptico (SE) de forma retrospectiva, con pacientes atendidos en nuestro centro durante el a o 2022 que cumplieron criterios para SE (ILAE 2015).

Material y m todos: Se incluyeron 12 pacientes (7 H-5 M) con edad media de 63 a os (rango 47-79). La mortalidad fue del 33,3%; 7 pacientes (58,6%) requirieron sedaci n e intubaci n y 3 pacientes (25%) recibieron tratamiento extrahospitalario. La causa m s frecuente fue la sintom tica aguda (41,3%; n = 5) seguida de la sintom tica remota (33,3%). El tipo m s frecuente de SE fue el convulsivo generalizado (41,6%) y el hallazgo m s frecuente en EEG fueron las PLDs (50%).

Resultados: Los factores relacionados fueron el puntaje mSTESS > 4 (OR 23,4; IC 0,89-613); la presencia de un SENC (OR 5; IC 1,27-1229); los de causa criptog nica (OR 39; IC 1,27-1229) y las potencialmente fatales (OR 3; IC 0,23-37,67); ausencia de tratamiento extrahospitalario (OR 5,72; IC 0,23-142,5); recibir tratamiento anest sico (OR 3; IC 0,21-42,62); una duraci n del SE > 12 horas y la presencia de PLDs (OR 1; IC 0,09-11 y OC 3; IC 0,21-426).

Conclusi n: A pesar de contar con un n mero insuficiente de pacientes para establecer una significaci n estad stica, los hallazgos valorados demuestran una asociaci n entre los factores de riesgo estudiados y el desenlace desfavorable en el SE, resaltando la necesidad de implantar protocolos adecuados en nuestra regi n.