




# Neurology perspectives



## 19357 - Consenso sobre un acrónimo con los signos de alarma para la identificación de pacientes adultos con sospecha de Encefalopatía Epiléptica y del Desarrollo (EED)

Villanueva Haba, V.<sup>1</sup>; Rodríguez Uranga, J.<sup>2</sup>; Smeyers Durá, P.<sup>3</sup>; Aledo Serrano, A.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Servicio de Neurología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe; <sup>2</sup>Servicio de Neurología. Centro de Neurología Avanzada (CNA); <sup>3</sup>Servicio de Neuropediatría. Hospital Universitari i Politècnic La Fe; <sup>4</sup>Servicio de Neurología. Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa.

### Resumen

**Objetivos:** Las EED se consideraron una categoría diferenciada por la ILAE en 2001 y numerosos pacientes adultos continúan incorrectamente diagnosticados, fuera de los cauces asistenciales adecuados y con un tratamiento inapropiado. Su correcto diagnóstico y manejo es fundamental para mejorar su calidad de vida y la de sus cuidadores. Un grupo de especialistas se propone definir un acrónimo sencillo, recogiendo los signos que ayuden a los profesionales no especialistas a identificar a estos pacientes y reintroducirlos en el proceso asistencial apropiado.

**Material y métodos:** Se celebraron 3 sesiones de 5 horas en total con un panel de expertos en epilepsia. Mediante la metodología de *brainstorming* se identificaron y consensuaron los signos para identificar pacientes con EED. Se establecieron los criterios mínimos que habrían de cumplirse y eligieron los términos para generar un acrónimo con un significado fácil recordar.

**Resultados:** Se consensó que los principales signos estarían contenidos en los términos e iniciales "motor - M", "epilepsia - E", "discapacidad intelectual - DI", "trastorno de la conducta - T" y "autismo - A". Se conformó así el acrónimo "MEDITA" y se consensó que los criterios mínimos serían "epilepsia - E" y "discapacidad intelectual - DI".

**Conclusión:** El acrónimo MEDITA recoge los signos que permitirían a facultativos no especialistas en epilepsia, e incluso a la población general, identificar de forma sencilla a adultos con una posible EED. La difusión y conocimiento del acrónimo podría así contribuir a la mejora de la asistencia sanitaria y de su calidad de vida.