



Neurology perspectives



19838 - Qué significan las tasas de respondedores del 90-99% en pacientes tratados con cenobamato: resultados de un estudio de extensión abierto

Álvarez Barón Fuentes, E.¹; Serratos, J.²; Gil-Nagel, A.³; Toledo, M.⁴; Thangavelu, K.⁵; Villanueva, V.⁶

¹Medical Affairs. Angelini Pharma; ²Servicio de Neurología. Fundación Jiménez Díaz; ³Servicio de Neurología. Hospital Ruber Internacional; ⁴Servicio de Neurología. Hospital Universitari Vall d'Hebron; ⁵MeDaStats; ⁶Servicio de Neurología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

Resumen

Objetivos: Mantener la libertad de crisis es el objetivo del tratamiento de la epilepsia. Sin embargo, no siempre es posible lograrlo. Aquí analizamos la tasa de respondedores del 90-99% con cenobamato durante la fase de extensión de abierta (OLE) del estudio C017 en pacientes adultos con crisis de inicio focal no controladas.

Material y métodos: Pacientes que completaron el período de tratamiento doble-ciego entraron en el OLE. Se realizó un análisis *post hoc* en pacientes que lograron tasas de respondedores (TR) \geq 90% pero que no alcanzaron la libertad de crisis para cuantificar los días libres de crisis durante todo el OLE.

Resultados: El 17% de los participantes lograron TR entre el 90-99% durante toda su participación en el OLE (mediana 291,3 semanas). Los respondedores del 90-99% tuvieron una mediana de duración de la epilepsia de 24 años en comparación con los 23 años de la población mITT (intención de tratar modificada). La frecuencia inicial de crisis fue de 8,75 para los respondedores del 90-99% frente a 9,5 para mITT. La proporción de días con crisis durante el período basal fue similar en ambas poblaciones: el 43,3% en los respondedores del 90-99% estuvieron libres de crisis durante el 99% de los días y más del 90% no tuvieron crisis durante al menos el 95% de los días.

Conclusión: Si bien la libertad de crisis es el objetivo terapéutico en la epilepsia, la reducción de crisis de \geq 90% obtenida con cenobamato también podría ser un resultado clínicamente relevante a largo plazo.