



# Neurology perspectives



## 19816 - Síndrome de Numb Chin (NCS) como manifestación de progresión tumoral

Bermejillo Barrera, J.; López López, M.; García Carmona, J.; Fajardo Sanchís, J.; Gómez Gozálviz, B.; Conesa García, E.; Vidal Mena, D.; Díaz Jiménez, I.; Espinosa Oltra, T.; Báidez Guerrero, A.; Carreón Guarnizo, E.; Cerdán Sánchez, M.; Pérez Vicente, J.

Servicio de Neurología. Hospital General Universitario Santa Lucía.

### Resumen

**Objetivos:** Poner de manifiesto la importancia del síndrome de hipoestesia mentoniana como predictor de neoplasia subyacente.

**Material y métodos:** Se realiza una revisión de los casos de NCS en un centro de segundo nivel en los últimos 10 años. Analizamos la anamnesis y exploración iniciales, las pruebas complementarias llevadas a cabo, el diagnóstico definitivo y la evolución del paciente.

**Resultados:** Se encontraron cuatro casos en los últimos 10 años de NCS en nuestro centro. En 3/4 de los casos existía una neoplasia maligna subyacente. De estos últimos, en 2/3 la sintomatología precedió al diagnóstico del tumor. Encontramos 3 tipos de neoplasias muy diferentes: carcinoma nasosinusal indiferenciado estadio IV; carcinoma de recto pT3pN2M0; linfoma difuso células B grandes con metástasis óseas, adenopáticas y pulmonares. En uno de los casos el responsable fue un proceso local: quiste odontogénico con extensa inflamación crónica.

**Conclusión:** El NCS es un síndrome poco común que se suele pasar por alto en la práctica clínica habitual. Sin embargo, puede ser la manifestación de una neoplasia subyacente. Por ello, ante la presencia de este cuadro, es necesario realizar una correcta correlación clínica, analítica y de imagen que nos permita realizar un diagnóstico certero.