



# Neurology perspectives



## 19656 - Discinesias y adherencia a safinamida y opicapona en pacientes fluctuantes con enfermedad de Parkinson: estudio observacional retrospectivo

Lorenzo Barreto, P.; Parés Moreno, I.; Pérez Torre, P.; Fanjul Arbós, S.; López-Sendón Moreno, J.; Pérez Trapote, F.; Sáez Marín, A.; Stiauren Fernández, E.; Patiño Patón, Á.; Martínez Castrillo, J.; Alonso Cánovas, A.

Servicio de Neurología. Hospital Ramón y Cajal.

### Resumen

**Objetivos:** Estudiar las diferencias en la aparición o empeoramiento de discinesias tras la introducción de safinamida (SA) u opicapona (OP) en pacientes con enfermedad de Parkinson fluctuante (EPF) y la probabilidad de discontinuación por este motivo.

**Material y métodos:** Estudio observacional retrospectivo de pacientes con EPF (2016-200) a los que se empezó tratamiento con SA u OP. Se recogieron las variables clínicas basales y demográficas, así como la aparición de discinesias o el empeoramiento de previas y la adherencia al tratamiento en la primera visita de seguimiento (13-15 semanas).

**Resultados:** Se incluyeron 60 pacientes con SA y 29 pacientes con OP (seguimiento de 13-15 semanas), con similar duración de la enfermedad y proporción por sexos, pero mayor edad en el grupo de SA (73, RI 67-79 vs. 65, RI 54-76,  $p = 0,03$ ). No hubo diferencias significativas en la aparición o empeoramiento de discinesias (13 vs. 17%,  $p = 0,750$ ), tampoco en la discontinuación del fármaco (22 vs. 35%,  $p = 0,196$ ), siendo las discinesias el motivo de la discontinuación en un único caso de SA y de ninguno en OP ( $p = 1,00$ ). No se encontraron diferencias significativas para la probabilidad de discontinuación en función del tratamiento usado (OR 0,5; IC 0,20-1,40;  $p = 0,199$ ) ni para la tasa de discontinuación (HR 1,21;  $p = 0,800$ ), aunque hubo una tendencia a mayor adherencia con SA.

**Conclusión:** En pacientes con EPF tanto SA como OP fueron bien tolerados, con una baja proporción de aparición o empeoramiento de discinesias o discontinuación por este motivo, sin diferencias significativas entre grupos.