



# Neurology perspectives



## 21210 - TENDENCIAS ACTUALES EN EL INICIO Y EFICACIA CLÍNICA DE CENOBAMATO: EXPERIENCIA CLÍNICA

Boy García, B.<sup>1</sup>; López-Maza, S.<sup>2</sup>; Quintana, M.<sup>2</sup>; Campos-Fernández, D.<sup>2</sup>; Fonseca, E.<sup>2</sup>; Abreira, L.<sup>2</sup>; Santamarina, E.<sup>2</sup>; Toledo, M.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Servicio de Neurología. Hospital Universitari Vall d'Hebron; <sup>2</sup>Unidad de Epilepsia. Servicio de Neurología. Hospital Universitari Vall d'Hebron.

### Resumen

**Objetivos:** Evaluar el cambio en la tendencia del uso de cenobamato y la eficacia clínica del mismo en pacientes con epilepsia.

**Material y métodos:** Estudio observacional unicéntrico de pacientes que iniciaron cenobamato (CNB) entre enero 2021 y diciembre 2023. Los pacientes se dividieron en dos grupos según el periodo de inicio de CNB: P1 (2021-2022) y P2 (2023). Se compararon ambos grupos según características clínico-demográficas y variables de eficacia (reducción crisis  $\geq 50\%$  y libertad de crisis).

**Resultados:** Se incluyeron 66 pacientes en P1 (57,6% hombres) y 126 en P2 (57,9% hombres). El origen más frecuente fue temporal en P2 (51,2 vs. 28,6%;  $p = 0,003$ ) y multifocal en P1 (31,7 vs. 13,2%;  $p = 0,003$ ). Al inicio de CNB, la mediana de FAC concomitantes (2 vs. 3;  $p < 0,001$ ) y la frecuencia de crisis mensuales (4 vs. 20;  $p < 0,001$ ) fue inferior en P2, igual que la mediana de dosis a los 3 (100 vs. 150;  $p < 0,001$ ) y 6 meses (150 vs. 200;  $p < 0,001$ ) y la tasa de EA a los 3 meses (37,1 vs. 53,1%,  $p = 0,037$ ). No hubo diferencias en la tasa de retención (90,3% P2 vs. 90,9% P1 a los 6 meses,  $p = 0,817$ ) ni en la tasa de respuesta a los 3 (67,5 vs. 70,3%;  $p = 0,699$ ) y 6 (67,0 vs. 77,6%;  $p = 0,166$ ) meses. Observamos mayor libertad de crisis a los 3 meses en P2 (27,4 vs. 14,1%;  $p = 0,041$ ).

**Conclusión:** Hay un cambio de tendencia en el uso del CNB, tratándose actualmente pacientes con menos FAC y menos crisis mensuales, con buena tolerabilidad y eficacia, y manteniendo elevada tasa de retención.