



Radiología



0 - Lesiones hiperecogénicas de la mama: ¿nos quedamos tranquilos?

A. González López, V.P. Beltrán Salazar, S. Ganau Macías, A. Martín Olóriz y M. Sentís Crivellé

UDIAT CD, Sabadell, España.

Resumen

Objetivo docente: Este trabajo pretende mostrar el amplio espectro de hallazgos mamarios hiperecogénicos, su correlación con otras técnicas diagnósticas y aportar las herramientas necesarias para saberlos diferenciar.

Revisión del tema: La ecografía de la mama es una herramienta diagnóstica de gran importancia en el estudio de la mama, especialmente útil en mujeres jóvenes y en mamas densas, casos en los que disminuye la sensibilidad de la mamografía. Es importante dominar la semiología ecográfica de las lesiones mamarias. La hiperecogenicidad de las lesiones, definida como un incremento de la ecogenicidad con respecto a la grasa adyacente o una ecogenicidad similar a la del parénquima mamario, se ha considerado clásicamente un signo de benignidad. Sin embargo, no siempre es así y el diagnóstico diferencial debe incluir también las lesiones malignas.

Conclusiones: Pese a que las lesiones hiperecogénicas de la mama son benignas en la mayoría de casos, el diagnóstico diferencial es amplio y debe incluir también las lesiones malignas. El radiólogo debe conocer el espectro radiológico y el manejo apropiado de las mismas.